

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Mebeverine EG 135 mg Filmtabletten Mebeverinhydrochlorid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Mebeverine EG jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Mebeverine EG 135 mg Filmtabletten und wofür wird es angewendet
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Mebeverine EG 135 mg Filmtabletten beachten
3. Wie ist Mebeverine EG 135 mg Filmtabletten einzunehmen
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich
5. Wie ist Mebeverine EG 135 mg Filmtabletten aufzubewahren
6. Weitere Informationen

1. WAS IST MEBEVERINE EG 135 MG FILMTABLETTEN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET

Arzneimittel, das selektiv auf die Spasmen des Kolons einwirkt, ohne auf den Darm oder die Sekretionen des Verdauungstraktes zu wirken.

Mebeverine EG ist angezeigt bei Funktionsstörungen des Dickdarms.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON MEBEVERINE EG 135 MG FILMTABLETTEN BEACHTEN

Mebeverine EG darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen mebeverinhydrochlorid oder einen der sonstigen Bestandteile von Mebeverine EG sind.
- wenn Sie an Mukoviszidose leiden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Mebeverine EG ist erforderlich,

- bei Patienten, die an akuter Porphyrie (= ein Problem des Stoffwechsels, das sich insbesondere durch typische porto-rote Urinfärbung, extreme Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht, Kopfschmerzen, Schmerzen der Glieder, Angst, Schlafprobleme,... äußert), leiden.

Bei Einnahme von Mebeverine EG mit anderen Arzneimitteln

Es gibt keine einzige Wechselwirkung.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Mebeverine EG zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Es gibt keine einzige Wechselwirkung.

Schwangerschaft und Stillzeit

Die klinische Erfahrung mit Mebeverine EG während der Schwangerschaft und Stillzeit ist bisher nicht ausreichend.

Es wird empfohlen, Mebeverine EG nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit einzunehmen. Wenn die Verabreichung von Mebeverine EG während der Stillzeit erforderlich ist, sollte das Stillen unterbrochen werden.

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Nicht zutreffend

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Mebeverine EG

Mebeverine EG enthält Laktose und Sucrose. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel eerst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. WIE IST MEBEVERINE EG 135 MG FILMTABLETTEN EINZUNEHMEN

Nehmen Sie Mebeverine EG immer genau nach Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

- *Erwachsene und Kinder über 15 Jahren:* 3 mal täglich eine Tablette.
- *In hartnäckigen Fällen:* 3 mal täglich 2 Tabletten, vorzugsweise 20 Minuten vor den Mahlzeiten.

Wenn die gewünschte Wirkung erreicht ist, kann die Dosis nach einigen Wochen schrittweise auf 1 Tablette 3 mal täglich reduziert werden.

- *Kinder von 10 bis 15 Jahren:* 3 mal täglich 1 Tablette.

Tabletten zur oralen Einnahme.

Wenn Sie eine größere Menge von Mebeverine EG eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viel Mebeverine EG eingenommen haben, ist unverzüglich Ihren Arzt, Apotheker oder den Giftnotruf (070/245.245) zu verständigen.

Wenn Sie die Anwendung von Mebeverine EG vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Mebeverine EG abbrechen

Nicht zutreffend.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH

Wie alle Arzneimittel kann Mebeverine EG Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Fälle allergischer Reaktionen wie zum Beispiel Juckreiz, Eruption, Nesselsucht und Angio-ödem (eine sehr seltene Erscheinungsform von Allergie, durch plötzliche Schwellung im Gesicht, Hals oder Larynx gekennzeichnet) wurden wahrgenommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST MEBEVERINE EG 135 MG FILMTABLETTEN AUFZUBEWAHREN

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Zimmertemperatur aufbewahren (15-25°C). In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Verpackung nach ‚Exp‘ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Mebeverine EG enthält

- Der Wirkstoff ist: Mebeverinhydrochlorid. Jede Tablette enthält 135 mg Mebeverinhydrochlorid.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Lactose, microkristalline Cellulose, Carboxymethylstärke-Natrium, Magnesiumstearat, hochdisperses wasserfreies Siliciumdioxid, Hydroxyethylcellulose, Sucrose, Hydroxypropylmethylcellulose, Titandioxid, Talkum

Wie Mebeverine EG aussieht und Inhalt der Packung

Weisse biconvexe Filmtabletten.

Packungen mit 40 oder 120 Filmtabletten in Blisterpackung von 20 Filmtabletten.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Gebrauchsinformation

Eurogenerics N.V.
Heizel Esplanade b22
B-1020 Brüssel
Belgien

Hersteller
Pharmazeutische Laboratoria Trenker S.A.
Dolezlaan 480-482
B-1180 Brüssel
Belgien

Registriernummer: BE187625

Abgabeform: Freie Abgabe

Die Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 03/2009
Das Zulassungsdatum dieser Packungsbeilage ist 03/2009