

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Gynoxin 2% Vaginalcreme Fenticonazolnitrat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung von Gynoxin 2% Vaginalcreme beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Gynoxin 2% Vaginalcreme und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Gynoxin 2% Vaginalcreme beachten?
3. Wie ist Gynoxin 2% Vaginalcreme anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Gynoxin 2% Vaginalcreme aufzubewahren ?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Gynoxin 2% Vaginalcreme und wofür wird es angewendet?

Gynoxin ist ein Arzneimittel gegen Infektionen, die von bestimmten Pilzen, Hefen und Bakterien verursacht werden.

Gynoxin Creme tötet Pilze, die eine Infektion der Vagina (Scheide) verursachen können. Pilzinfektionen der Vagina gehen meistens mit Juckreiz und Ausfluss einher.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Gynoxin 2% Vaginalcreme beachten?

Gynoxin 2% Vaginalcreme darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Fenticonazolnitrat oder einen der in Abschnitt 6. Genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie schwanger sind oder stillen, es sei denn, dass Ihrem Arzt dies erforderlich findet.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Bei einer Behandlung mit Gynoxin sind die Beschwerden meistens nach 2 bis 3 Tagen ganz verschwunden. Wenn nach einer Dreitageskur die Beschwerden nicht verschwunden sind, müssen Sie Ihren Arzt kontaktieren. Manchmal ist eine zweite Kur erforderlich.
- Ihr Arzt kann es für ratsam halten, Ihren Partner gleichzeitig mit Gynoxin 2% Vaginalcreme zu behandeln, um eine Neuinfektion zu vermeiden.
- Wenn Sie noch andere Arzneimittel verwenden. Bitte lesen Sie auch die Rubrik: „Bei Anwendung von Gynoxin mit anderen Arzneimitteln“.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie dieses mittel anwenden.

Anwendung von Gynoxin 2% Vaginalcreme zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Die Möglichkeit muss berücksichtigt werden, dass die Qualität des Latex von Kondomen oder von intrauterinen Geräten durch fettige Hilfsstoffe in der Gynoxin vaginalcreme beeinträchtigt werden

kann.

Anwendung von Gynoxin 2% Vaginalcreme zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Nicht zutreffend.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Gynoxin darf während der Schwangerschaft nicht angewendet werden nur auf Empfehlung Ihres Arztes.

Gynoxin darf während der gesamten Dauer der Stillzeit nicht angewendet werden nur auf Empfehlung Ihres Arztes.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Nicht zutreffend.

Gynoxin 2% Vaginalcreme enthält:

Propylenglycol, Lanolin und Cetylalkohol. Können örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

3. Wie ist Gynoxin 2% Vaginalcreme anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.


Die empfohlene Dosis beträgt:

Der Inhalt (ca. 5 g) muss zweimal täglich (morgens und abends vor dem Schlafengehen) an 3 aufeinander folgenden Tagen tief in die Vagina eingebracht werden.

Gynoxin Creme muss mithilfe eines Wegwerfapplikators in die Vagina eingebracht werden. Dies kann am besten in Rückenlage mit hochgezogenen und gespreizten Beinen erfolgen.


Gebrauchsanweisung:

1




Schrauben Sie den Applikator auf die Tube statt der Kappe.

2




Drücken Sie die Tube vorsichtig am Ende zusammen, um den Applikator zu füllen. Ohne gegenteilige Verordnung von Ihrem Arzt muss der Applikator vollständig gefüllt sein.

3



Entfernen Sie den Applikator von der Tube, die sofort mit der Kappe verschlossen werden muss.

4



Bringen Sie den Applikator vorsichtig möglichst tief in die Vagina ein, während Sie in Rückenlage mit hochgezogenen und gespreizten Beinen liegen. Drücken Sie den Stift vollständig ein. Entfernen Sie dann den Applikator, ohne den Stift zu berühren.

Falls erforderlich, kann die Kur, in Rücksprache mit Ihrem Arzt, wiederholt werden.

Ihr Arzt wird Sie informieren, wie lange Sie Gynoxin verwenden sollen.

Wenn Sie eine größere Menge von Gynoxin 2% Vaginalcreme angewendet haben, als Sie sollten

Falls Sie mehr Gynoxin verwendet haben, als Sie sollten, suchen Sie bitte unverzüglich Ihren Arzt, Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245) auf.

Wenn Sie die Anwendung von Gynoxin 2% Vaginalcreme vergessen haben

Nicht zutreffend.

Wenn Sie die Anwendung von Gynoxin 2% Vaginalcreme abbrechen

Nicht zutreffend.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nach dem Einbringen von Gynoxin Creme in die Vagina kann bei einigen Patienten ein leicht brennendes Gefühl auftreten. In der Regel geht dies schnell vorbei. Obwohl bei einem unzureichenden Ergebnis die Behandlung manchmal wiederholt werden muss, kann eine Langzeitbehandlung Überempfindlichkeitsreaktionen auslösen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Nachstehend wird der Prozentsatz der Fälle wiedergegeben, bei denen eine bestimmte unerwünschte Nebenwirkung möglich ist:

Sehr häufig: $\geq 1/10$; häufig: $\geq 1/100$, $< 1/10$; gelegentlich: $\geq 1/1000$, $< 1/100$; selten: $\geq 1/10000$, $< 1/1000$; sehr selten: $< 1/10000$, nicht bekannt (nicht abschätzbar aus den verfügbaren Daten).

Systemorganklassen	Häufigkeit	Bevorzugte Ausdruck
Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der Brustdrüse	Sehr selten	vulvovaginal brennendes Gefühl
Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes	Sehr selten	erythematöse Hautausschlag

Beenden der Behandlung für den Fall von Überempfindlichkeitsreaktionen oder beim Auftreten von Resistenz von Mikroorganismen.

5. Wie ist Gynoxin 2% Vaginalcreme aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Bei Zimmertemperatur (15-25°C) aufbewahren. In der Originalverpackung aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und Blister nach "EXP" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Gynoxin 2% Vaginalcreme enthält

- Der Wirkstoff ist Fenticonazolnitrat 2 g/100 g.

- Die sonstige Bestandteile sind Propylenglykol, hydrogeniertes Lanolin, Mandelöl, Polyglykolester von Fettsäuren, Cetylalkohol, Glycerylmonostearat, Natriumedetat und gereinigtes Wasser bis 100 g.

Wie Gynoxin aussieht und Inhalt der Packung

Gynoxin ist eine Vaginalcreme. Sie wird in einer Tube von 35 g Creme mit 7 Wegwerfapplikatoren geliefert.

Verkaufsabgrenzung

Verschreibungspflichtig.

Zulassungsnummer

)'-504C,

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 10/2013