



# DUAC® Akne Gel 10 mg/g / 50 mg/g

Clindamycin und Benzoylperoxid



**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

## Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist DUAC Akne Gel und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von DUAC Akne Gel beachten?
3. Wie ist DUAC Akne Gel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist DUAC Akne Gel aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## 1. WAS IST DUAC AKNE GEL UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

DUAC Akne Gel enthält zwei Wirkstoffe: Clindamycin und Benzoylperoxid. DUAC Akne Gel gehört zur Gruppe der „Aknemittel“.

DUAC Akne Gel wird angewendet zur Behandlung leichter bis mittelschwerer Akne vulgaris.

- Clindamycin ist ein Antibiotikum, das die bei Akne vorkommenden Bakterien abtötet.
- Benzoylperoxid reduziert die Anzahl der Mitesser. Es tötet außerdem die bei Akne vorkommenden Bakterien ab und macht die Haut weniger fettig.

Die gemeinsame Anwendung dieser Wirkstoffe in DUAC Akne Gel führt dazu, dass:

- die Anzahl der Bakterien, die die Akneläsionen hervorrufen, reduziert wird
- die Anzahl der Akneläsionen reduziert wird
- die Bildung neuer Mitesser und Akneläsionen verhindert wird
- die Haut weniger fettig ist.

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON DUAC AKNE GEL BEACHTEN?

**DUAC Akne Gel darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Clindamycin, Benzoylperoxid oder einen der sonstigen Bestandteile von DUAC Akne Gel sind (siehe Abschnitt 6).

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen das Antibiotikum Lincomycin sind.

Wenden Sie DUAC Akne Gel nicht an, wenn eine dieser Aussagen auf Sie zutrifft. Sprechen Sie vor der Anwendung von DUAC Akne Gel mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht sicher sind.

**Bei der Anwendung von DUAC Akne Gel ist besondere Vorsicht erforderlich**

- DUAC Akne Gel ist nur zur Anwendung auf der Haut bestimmt. Kontakt mit Augen, Lippen und Mund sollte vermieden werden. Spülen Sie Ihre Augen mit reichlich Wasser, sollte DUAC Akne Gel versehentlich in die Augen gelangen.
- Wenden Sie DUAC Akne Gel nicht auf gereizten Hautarealen an, wie z. B. Schnittverletzungen, Hautabschürfungen, Sonnenbrand oder Ekzemen.
- Wenden Sie DUAC Akne Gel auf empfindlichen Hautarealen sparsam an.
- Vermeiden Sie den Kontakt von DUAC Akne Gel mit farbigen Textilien, wie z. B. Kleidung, Handtücher und Bettwäsche. **DUAC Akne Gel kann diese**

**Materialien bleichen.**

- DUAC Akne Gel kann Haare bleichen.
- DUAC Akne Gel kann Ihre Haut empfindlicher gegenüber der schädlichen Wirkung des Sonnenlichts machen. Vermeiden Sie daher künstliches UV-Licht und beschränken Sie die Zeit in der Sonne auf ein Mindestmaß.
- Überschreiten Sie nicht die vorgeschriebene Dosierung.

Sprechen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn:

- der Patient unter 12 Jahre alt ist.
- Sie jemals eine der folgenden Darmerkrankungen hatten: „örtlich begrenzte Darmentzündung“, „Kolitis ulcerosa (ulzerative Dickdarmentzündung)“ oder „Antibiotika-assoziierte Kolitis (Antibiotika-assoziierte Dickdarmentzündung)“.

**Anwendung von DUAC Akne Gel mit anderen Arzneimitteln oder anderen Mitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel oder pflanzliche Arzneimittel handelt.

Insbesondere ist Ihr Arzt oder Apotheker zu informieren, wenn Sie Folgendes anwenden:

- andere Aknemittel einschließlich äußerlich anzuwendende Antibiotika
- medizinische oder hautabreibende (abrasive) Seifen und Waschlotionen
- Seifen oder andere Kosmetika mit stark austrocknendem Effekt
- Produkte mit hohem Gehalt an Alkohol oder „Adstringentien“.

Diese Produkte können bei gleichzeitiger Anwendung mit DUAC Akne Gel mit der Zeit Ihre Haut reizen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine dieser Aussagen auf Sie zutrifft, sprechen Sie vor der Anwendung mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie Ihren Arzt vor der Anwendung dieses Arzneimittels um Rat, wenn Sie schwanger sind, planen schwanger zu werden oder stillen.

## 3. WIE IST DUAC AKNE GEL ANZUWENDEN?

Wenden Sie DUAC Akne Gel immer genau nach Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

- Wenden Sie DUAC Akne Gel einmal täglich abends an.
- Es kann 4 bis 6 Wochen dauern, bis Sie die volle Wirksamkeit von DUAC Akne Gel beobachten können.
- Wenden Sie DUAC Akne Gel nicht länger als 12 Wochen ununterbrochen an. Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wie lange die Behandlung dauern wird.

#### Wie DUAC Akne Gel aufzutragen ist

1. Entfernen Sie Ihr Make-up sorgfältig.
2. Die betroffenen Hautstellen gründlich reinigen. Dann mit warmem Wasser abspülen und behutsam trocken tupfen.
3. Mit den Fingerspitzen einen dünnen Gelfilm auf die betroffene Haut auftragen.
4. Tragen Sie das Gel auf das gesamte, von Akne betroffene Hautareal und nicht nur auf die einzelnen Akneläsionen auf.
  - Für die ausschließliche Behandlung des Gesichts reicht die aus der Tube entnommene Menge des Gels, die von Ihrer Fingerspitze bis zum ersten Fingergelenk (die erste Beuge des Fingers) reicht. Dies ist eine „Fingerspitze“.
  - Zur Anwendung auf Gesicht und Rücken reichen insgesamt zweieinhalb Fingerspitzen.Zieht das Gel nicht gut in die Haut ein, so verwenden Sie zu viel.
5. Waschen Sie nach dem Auftragen des Gels Ihre Hände.
6. Nachdem das Gel getrocknet ist, können Sie ein nicht-fettendes Make-up verwenden.

#### Wenn Sie eine größere Menge von DUAC Akne Gel angewendet haben, als Sie sollten

Es liegen keine Erfahrungen zur Überdosierung mit DUAC Akne Gel vor.

#### Wenn Sie die Anwendung von DUAC Akne Gel vergessen haben

- Verwenden Sie nicht die doppelte Menge, um die vergessene Einzeldosis zu ersetzen.
- Tragen Sie die nächste Dosis wie gewohnt zur gleichen Zeit auf.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann DUAC Akne Gel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die folgenden Nebenwirkungen können bei Anwendung dieses Arzneimittels auftreten:

#### **Beenden Sie die Anwendung von DUAC Akne Gel und suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, wenn eine der folgenden schwerwiegenden Nebenwirkungen bei Ihnen auftritt - Sie könnten dringende ärztliche Behandlung benötigen:**

- Anzeichen allergischer Reaktionen (wie z. B. Schwellung von Gesicht, Augen, Lippen oder Zunge, Nesselausschlag oder Atemprobleme)
- schwerer oder anhaltender Durchfall, oder Bauchkrämpfe
- starkes Brennen, Schälten oder Jucken.

Anderere mögliche Nebenwirkungen:

Wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen bemerken, versuchen Sie DUAC Akne Gel weniger oft anzuwenden oder setzen Sie die Behandlung für einige Tage ab und beginnen Sie dann erneut.

#### Sehr häufige Nebenwirkungen

(mindestens 1 Behandelte von 10 ist betroffen)

- Rötung, Schälten und trockene Haut

#### Häufige Nebenwirkungen

(weniger als 1 Behandelte von 10 ist betroffen)

- Brennen, Juckreiz

#### Gelegentlich auftretende Nebenwirkungen

(weniger als 1 Behandelte von 100 ist betroffen)

- Taubheitsgefühl (Parästhesie), Verschlechterung der Akne

Daneben wurde auch über Hautausschläge berichtet.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

#### 5. WIE IST DUAC AKNE GEL AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Großhandel/Apotheke:** Im Kühlschrank lagern (2°C - 8°C). Nicht einfrieren. Kühlkette.

**Patienten:** Nicht über 25°C lagern. Das Arzneimittel ist 2 Monate nach Erhalt zu verwenden.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton nach <Verwendbar bis> angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft, die Umwelt zu schützen.

#### 6. WEITERE INFORMATIONEN

##### Was DUAC Akne Gel enthält

- Die Wirkstoffe sind: Clindamycin-2-hydrogenphosphat, entsprechend Clindamycin 1% w/w (10 mg/g), und wasserhaltiges Benzoylperoxid, entsprechend Benzoylperoxid 5% w/w (50 mg/g).
- Die sonstigen Bestandteile sind: Carbomer (50000 mPa.s); Dimeticon (100 cSt); 3-Dodecylolxycarbonyl-2/3-sulfopropansäure, Dinatriumsalz; Natriumedetat; Glycerol; Hochdispertes Siliciumdioxid; Poloxamer 182; gereinigtes Wasser; Natriumhydroxid.

##### Wie DUAC Akne Gel aussieht und Packungsgrößen

- DUAC Akne Gel ist in Tuben mit 5, 6, 15, 25, 30, 50, 55, 60 und 70 g erhältlich.
- DUAC Akne Gel ist ein farbloses, leicht gelbliches Gel.
- Jede Faltschachtel enthält eine Tube.
- Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

##### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, 80700 München; Service-Tel.: 0180 34 56 400; <http://www.glaxosmithkline.de>

Mitvertrieb:

Stiefel GmbH & Co. KG, Industriestraße 32-36, 23843 Bad Oldesloe

Hersteller:

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Finisklin Business Park, Sligo, Ireland

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Oktober 2011.**