

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

ACICLOVIR TEVA 5% CREME

Aciclovir

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss ACICLOVIR TEVA 5% CREME jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist ACICLOVIR TEVA 5% CREME und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von ACICLOVIR TEVA 5% CREME beachten?
3. Wie ist ACICLOVIR TEVA 5% CREME anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist ACICLOVIR TEVA 5% CREME aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST ACICLOVIR TEVA 5% CREME UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

ACICLOVIR TEVA 5% CREME enthält Aciclovir, ein Arzneimittel gegen herpesviren.

Es ist angezeigt zur Behandlung von Fieberbläschen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ACICLOVIR TEVA 5% CREME BEACHTEN?

ACICLOVIR TEVA 5% CREME darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Aciclovir, Valaciclovir oder einen der sonstigen Bestandteile von die creme basis sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von ACICLOVIR TEVA 5% CREME ist erforderlich,

- die erste Diagnose von Fieberbläschen wird am besten durch den Arzt gestellt.
- ACICLOVIR TEVA 5% CREME ist nicht für das Auftragen auf die Mundschleimhaut geeignet.
- achten Sie darauf, dass die Creme nicht in die Augen gelangt.
- es kann zu einem vorübergehenden Kribbeln der Haut kommen.
- wenden Sie ACICLOVIR TEVA 5% CREME nicht für die Behandlung von herpes genitalis an.
- konsultieren Sie Ihren Apotheker oder Arzt falls die hautläsionen sich während der Behandlung mit diesem Präparat auf anormale Weise verändern; dies kann z.B. auf eine bakterielle Begleitinfektion hinweisen.
- wenn Sie schwer immundepressive sind (z.B. wenn Sie AIDS haben oder wenn Sie eine Knochenmarktransplantation bekommen haben). Konsultieren Sie Ihren Arzt für die Behandlung jeder Infektion.

Bei Anwendung von ACICLOVIR TEVA 5% CREME mit anderen Arzneimitteln

Mann hat keine, klinisch bezeichnende Interaktion identifiziert.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Anwendung von ACICLOVIR TEVA 5% CREME zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Keine Besonderheiten

Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Es besteht keine Gegenanzeige gegen die Anwendung von ACICLOVIR TEVA 5% CREME auf Fieberbläschen in der Schwangerschaft. Selbstverständlich bleibt Vorsicht geboten. Im Zweifelsfall konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Stillzeit

Es besteht keine Gegenanzeige gegen die Anwendung von ACICLOVIR TEVA 5% CREME auf Fieberbläschen in der Stillzeit. Selbstverständlich bleibt Vorsicht geboten. Im Zweifelsfall konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

ACICLOVIR TEVA 5% CREME übt keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit oder auf das Bedienen von Maschinen aus.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von ACICLOVIR TEVA 5% CREME Nicht anwendbar

3. WIE IST ACICLOVIR TEVA 5% CREME ANZUWENDEN?

Wenden Sie ACICLOVIR TEVA 5% CREME immer genau nach Anweisung des Arztes ein an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Bitte konsultieren Sie wieder Ihren Arzt wenn keine Besserung eintritt.

Erwachsene und Kinder:

- ACICLOVIR TEVA 5% CREME wird 5 Mal am Tage alle 4 Stunden während 5 Tagen auf die Bläschen oder auf die sich noch bildende Bläschen aufgetragen.
- Die Behandlung muss an 5 aufeinanderfolgenden Tagen erfolgen, auch wenn die Bläschen nicht ganz durchbrechen.
- Ist die Infektion nicht vollständig abgeheilt, so kann die Behandlung noch 5 Tage lang fortgesetzt werden.
- ACICLOVIR TEVA 5% CREME muss so schnell wie möglich nach Ausbruch der Infektion auf die Bläschen oder auf die sich noch bildende Bläschen aufgetragen werden.
- Eine erneut auftretende Infektion kündigt sich häufig mit einier kurzen Periode an, in der die betroffenen Stellen schmerzhaft oder taub sind, brennen oder jucken. Nahezu jeder, die regelmäßig unter Fieberbläschen leidet, kennt diese Anzeichen und spürt, dass eine Infektion bevorsteht. Mit der Behandlung ist am besten bereits in diesem Stadium oder direkt nach Auftreten der ersten Bläschen zu beginnen.

Die Creme ist für den äußerlichen Gebrauch bestimmt.

Wenn Sie eine größere Menge von ACICLOVIR TEVA 5% CREME angewendet haben, als Sie sollten

Mengen bis zu 4 g Aciclovir wurden 10 Tage lang ohne schädliche Nebenwirkungen eingenommen. Bei versehentlichem Verschlucken des ganzen Inhalts einer Tube mit 2 g Creme, die 100 mg Aciclovir enthält, sind keine schädlichen Wirkungen zu erwarten. Aciclovir kann durch Dialyse aus dem Körper ausgeschieden werden.

Wenn Sie zuviel ACICLOVIR TEVA 5% CREME eingenommen haben, nehmen Sie sofort Kontakt auf mit Ihrem Arzt, Apotheker oder mit dem Antifozentrum (070/245.245)

Wenn Sie die Anwendung von ACICLOVIR TEVA 5% CREME vergessen haben

Sobald Sie bemerken dass Sie vergessen haben ACICLOVIR TEVA 5% CREME aufzutragen, bringen Sie ACICLOVIR TEVA 5% CREME an und kontinuierlich Sie die Behandlung wie erklärt in „Wie ist ACICLOVIR TEVA 5% CREME anzuwenden“.

Wenn Sie die Anwendung von ACICLOVIR TEVA 5% CREME abbrechen

Keine Besonderheiten

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann ACICLOVIR TEVA 5% CREME Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die folgenden Nebenwirkungen sind gemeldet:

Erkrankungen der Haut und Unterhaut

Manchmal $\geq 1/1.000$ und $\leq 1/100$

- vorübergehend ein brennendes oder stechendes Gefühl nach auftragen der Creme.
- ein leichtes Austrocknen oder Schuppen der Haut.

Selten $\geq 1/10.000$ und $\leq 1/1.000$

- eine Rötung (Erythem).
- Allergische Reaktionen der Haut (Kontaktdermatitis). Wenn eine solche Nebenwirkung auftritt, soll die Behandlung werden abgebrochen.

Erkrankungen des Immunsystems:

Sehr selten $\geq 1/100.000$ und $\leq 1/10.000$

- Direkte Überempfindlichkeitsreaktionen. Wenn eine solche Nebenwirkung auftritt, soll die Behandlung werden abgebrochen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST ACICLOVIR TEVA 5% CREME AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Raumtemperatur (15 – 25°C) aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was ACICLOVIR TEVA 5% CREME enthält

- Der Wirkstoff ist Aciclovir.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Propylenglycol – Tefose – Labrafil – Mineralöl - Poloxamer 407 - Natriumdodecylsulfat - gereinigtes Wasser

Wie ACICLOVIR TEVA 5% CREME aussieht und Inhalt der Packung
Tube mit 2 g Creme.

Pharmazeutischer Unternehmer
Teva Pharma Belgium AG
Laarstraat 16
B-2610 Wilrijk

Hersteller
Laboratorio Farmaceutico C.T.
Via D. Alighieri 71
18038 Sanremo (IM)
Italien

Zulassungsnummer

BE 216361

Verkaufsabgrenzung

Freie Abgabe.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im März 2009.