

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn Sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Inderm Lotion jedoch vorschriftsgemäss angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 8 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Inderm Lotion 10 mg/g, Lösung zur Anwendung auf der Haut und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Inderm Lotion 10 mg/g, Lösung zur Anwendung auf der Haut beachten ?
3. Wie ist Inderm Lotion 10 mg/g, Lösung zur Anwendung auf der Haut anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Inderm Lotion 10 mg/g, Lösung zur Anwendung auf der Haut aufzubewahren?
6. Weitere Angaben

INDERM Lotion 10 mg/g
Lösung zur Anwendung auf der Haut
(Erythromycin)

Der *arzneilich wirksame Bestandteil* ist Erythromycin; Ein g Lotion enthält 10 mg Erythromycin (entspr. 1%).

Die *sonstigen Bestandteile (Hilfsstoffe)* sind Isopropylalkohol, Isopropylmyristat und Dibutyladipat.

Pharmazeutischer Unternehmer:

NEOCARE NV
Heizel Esplanade b22
1020 Brüssel

Hersteller:

DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH · Luitpoldstrasse 1 · D-85276 Pfaffenhoffen.

Registriernummern :

989 IS 425 F 11

1. Was ist Inderm Lotion 10 mg/g, Lösung zur Anwendung auf der Haut und wofür wird es angewendet?

Pharmazeutische Form und Packungsgrössen :

Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Flasche mit 50 ml Lotion.

Arzneimittelgruppe :

Antibakterielle Lotion zur äußerlichen Behandlung der Akne.

Therapeutische Indikationen :

Zur lokalen Behandlung der Akne, insbesondere der entzündlichen Formen mit Papeln (Knötchen) und Pusteln (Eiterbläschen).

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Inderm Lotion 10 mg/g, Lösung zur Anwendung auf der Haut beachten?

Inderm Lotion darf nicht angewendet werden,

Bei einer Überempfindlichkeit gegen Erythromycin oder einen der anderen Bestandteile der Lotion.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Inderm Lotion ist erforderlich,

- Die Lotion ist alkoholhaltig; vermeiden Sie den Kontakt mit offenen Wunden, der Schleimhaut oder den Augen.
- Die Lotion ist brennbar.
- Eine mögliche Kreuzüberempfindlichkeit zwischen den verwandten Makroliden kann auftreten.
- Eine Kreuzresistenz mit den anderen Antibiotika der Makrolidgruppe wie auch mit Lincomycin und Clindamycin kann eintreten.
- Die Anwendung von Antibiotika kann mit der Entwicklung einer bakteriellen Resistenz einhergehen. In diesem Fall ist die Behandlung abzubrechen und sind geeignete Maßnahmen zu treffen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn sich herausstellt, dass die Wirksamkeit abnimmt.

Wenn Sie noch andere Arzneimittel verwenden, lesen Sie bitte auch den Abschnitt "Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln".

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn einer der obenerwähnten Warnhinweise auf Sie zutrifft oder in der Vergangenheit zutraf.

Bei Anwendung von Inderm Lotion zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Nicht zutreffend.

Schwangerschaft

Inderm Lotion kann in der empfohlenen Dosierung während der Schwangerschaft angewendet werden.

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Stillzeit

Inderm Lotion kann in der empfohlenen Dosierung in der Stillzeit angewendet werden.

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Inderm Lotion hat keinen Einfluß auf die Verkehrstüchtigkeit oder die Bedienung von Maschinen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Inderm Lotion

Die Lotion ist alkoholhaltig; vermeiden Sie den Kontakt mit offenen Wunden, der Schleimhaut oder den Augen.

Die Lotion ist brennbar.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Wenn Sie gleichzeitig Schälmittel (Präparate, die die oberflächliche Hautschicht ablösen) verwenden, kann es zu einem gehäuften Auftreten von Hautreizungen kommen.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. Wie ist Inderm Lotion 10 mg/g, Lösung zur Anwendung auf der Haut anzuwenden?

Brauchen Sie Inderm Lotion immer genau nach Anweisung des Arztes. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Wenn keine Besserung eintritt, wenden Sie sich nochmals an Ihren Arzt.

Soweit vom Arzt nicht anders verordnet, wird Inderm Lotion morgens und abends nach dem Reinigen der Haut verwendet.

Die Lotion wird mit Hilfe eines Wattebausches, Zellstofftupfers o.ä. auf das erkrankte Gebiet aufgetragen. Die Behandlung sollte über einen Zeitraum von mindestens 6 Wochen erfolgen.

In der Regel ist die Anwendung über 8 Wochen zur Erzielung eines guten Ergebnisses ausreichend. In Einzelfällen kann diese Behandlungszeit auf Anweisung des Arztes überschritten werden.

Dieses Arzneimittel darf ohne ärztliche Anweisung nicht länger als 8 Wochen angewendet werden.

Wenn Sie die Anwendung von Inderm Lotion vergessen haben :

Die Behandlung möglichst schnell fortsetzen.

Verwenden Sie nie die doppelte Dosis Inderm Lotion, um die vergessene Dosis auszugleichen.

Auswirkungen, wenn die Behandlung mit Inderm Lotion abgebrochen wird:

Ein vorzeitiger Abbruch der Behandlung kann in bakterieller Resistenz resultieren. Eine Behandlungsdauer von mindestens 6 Wochen ist notwendig.

Wenn Sie eine grössere Menge von Inderm Lotion eingenommen haben, als Sie sollten :

Bisher wurde kein Fall einer Überdosierung mit Inderm Lotion berichtet. Es ist daher unwahrscheinlich, daß bei äußerlicher Anwendung eine Überdosierung auftritt.

Wenn Inderm Lotion versehentlich verschluckt wurde, trinken Sie eine große Menge Wasser zur Verdünnung.

Nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem Anti-Gift-Zentrum auf (070/24 52 45).

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich ?

Wie alle Arzneimittel kann Inder Lotion Nebenwirkungen haben.

Die alkoholische Lotion kann gelegentlich, v.a. zu Beginn der Behandlung, vorübergehendes Brennen, leichte Rötung, Juckreiz oder eine oberflächliche Schuppung der Haut verursachen.

In diesen Fällen ist Inderm Lotion weniger häufig anzuwenden. Bei starker Ausprägung sollten Sie die Behandlung abbrechen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, oder die Sie als ernsthaft empfinden.

5. Wie ist Inderm Lotion 10 mg/g, Lösung zur Anwendung auf der Haut aufzubewahren ?

Inderm Lotion für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bewahren Sie Inderm Lotion nicht unter 15°C und nicht über 25°C.

Verfallsdatum

Sie dürfen Inderm Lotion nach dem auf dem Etikett oder dem Umkarton angegebenen Verfalldatum hinter der Meldung „EX“ oder „EXP“ nicht mehr verwenden. Die ersten zwei Ziffern entsprechen dem Monat, die letzten Ziffern dem Jahr. Das Verfallsdatum ist der letzte Tag des Monats, in dem das Arzneimittel verfällt

6. Weitere Angaben

Für alle Informationen bezüglich dieses Arzneimittels, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Pharmazeutischen Unternehmers in Verbindung: NeoCare N.V., Heizel Esplanade b22, B-Brüssel, Tel. +32 (0)2 479 78 78.

Abgabeform : freie Abgabe.

A. Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im: Februar 2007.

B. Das Zulassungsdatum dieser Packungsbeilage ist :