

**PACKUNGSBEILAGE**

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

### NEXIAM 20 mg, magensaftresistente Tabletten NEXIAM 40 mg, magensaftresistente Tabletten

Esomeprazol

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist NEXIAM und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von NEXIAM beachten?
3. Wie ist NEXIAM einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist NEXIAM aufzubewahren?
6. Weitere Informationen?

#### **1. WAS IST NEXIAM UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

NEXIAM enthält ein als Esomeprazol bezeichnetes Arzneimittel. Dies gehört zur Stoffgruppe der Protonenpumpenhemmer. Sie wirken, indem sie die Menge der vom Magen produzierten Magensäure verringern.

NEXIAM wird zur Behandlung folgender Krankheiten angewendet:

- „gastroösophageale Refluxkrankheit“ (GERD). Die Magensäure steigt in die Speiseröhre (die Verbindung zwischen Rachen und Magen) und verursacht Schmerzen, Entzündungen und Verbrennungen;
- Bei Geschwüren im Bereich des Magens und des oberen Teils des Darms, die mit dem „*Helicobacter pylori*“ genannten Bakterium infiziert sind. Wenn Sie an dieser Erkrankung leiden, verordnet Ihnen Ihr Arzt möglicherweise zusätzlich Antibiotika zur Behandlung der Infektion und um ein Abheilen des Geschwürs zu ermöglichen.
- Magengeschwüre, die auf Arzneimittel, NSAID genannt (nicht-steroidale Entzündungshemmer) zurückzuführen sind. NEXIAM wird auch zur Prävention von Magengeschwüren angewendet, wenn Sie NSAID einnehmen;
- erhöhter Säuregehalt des Magensafts in Verbindung mit einem Geschwür des Pankreas (Zollinger-Ellison-Syndrom);
- Fortsetzung der Behandlung nach Prävention einer Rezidivblutung von Ulzera mit intravenösem NEXIAM

#### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON NEXIAM BEACHTEN?**

**NEXIAM darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Esomeprazol oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind (siehe Abschnitt 6: Weitere Informationen);
- wenn Sie gegen andere Protonenpumpenhemmer allergisch sind;
- wenn Sie ein Arzneimittel, das Nelfinavir enthält, einnehmen (zur HIV-Behandlung verwendet).

Nehmen Sie NEXIAM nicht ein, falls eine der oben genannten Warnungen auf Sie zutrifft. Falls Sie sich nicht ganz sicher sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie NEXIAM einnehmen.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von NEXIAM ist erforderlich,**

Bevor Sie mit der Einnahme dieses Medikaments beginnen, müssen Sie Ihren Arzt oder Apotheker informieren, wenn Sie an:

- einer ernsthaften Lebererkrankung leiden;
- einer ernsthaften Nierenerkrankung leiden.

NEXIAM kann die Beschwerden anderer Erkrankungen überdecken. **Tritt vor oder während Ihrer Behandlung mit NEXIAM eine der folgenden Wirkungen ein, müssen Sie sofort Ihren Arzt informieren:**

- Sie haben unfreiwillig viel Gewicht verloren und haben Probleme mit dem Schlucken;
- Sie leiden unter Magenschmerzen oder Verdauungsstörungen;
- Sie beginnen, mehrmals Nahrung oder Blut zu erbrechen;
- Ihr Stuhlgang ist schwarz (blutig).

Wenn Ihnen NEXIAM zur Einnahme „nach Bedarf“ verschrieben wurde, wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn die Krankheitsanzeichen anhalten oder sich verändern.

**Bei Anwendung von NEXIAM mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt. NEXIAM kann die Wirkung von einigen Arzneimitteln beeinflussen, und manche Arzneimittel können einen Einfluss auf die Wirkung von NEXIAM haben.

NEXIAM darf nicht eingenommen werden, wenn Sie ein Arzneimittel, das **Nelfinavir** enthält, einnehmen (zur HIV-Behandlung verwendet).

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eines der folgenden Arzneimittel einnehmen:

- Atazanavir (zur HIV-Behandlung verwendet);
- Ketoconazol, Itraconazol oder Voriconazol (zur Behandlung von Infektionen, die durch einen Pilz hervorgerufen werden);
- Citalopram, Imipramin oder Clomipramin (zur Behandlung von Depressionen angewendet);
- Diazepam (zur Behandlung von Angstzuständen, als Muskelrelaxans oder gegen epileptische Anfälle);
- Fenytoin (angewendet bei Epilepsie). Wenn Sie Phenytoin einnehmen, wird Ihr Arzt Sie beobachten müssen, wenn Sie mit der Einnahme von NEXIAM beginnen oder aufhören;
- Arzneimittel, die zur Blutverdünnung dienen, wie Warfarin. Ihr Arzt wird Sie beobachten müssen, wenn Sie mit der Einnahme von NEXIAM beginnen oder aufhören;
- Cisaprid (bei Verdauungsbeschwerden und Magenbrennen angewendet).

Wenn Ihr Arzt Ihnen zusammen mit NEXIAM die Antibiotika Amoxicillin und Clarithromycin für die Behandlung von Geschwüren, die durch Infektionen mit *Helicobacter pylori* verursacht wurden, verschrieben hat, ist es sehr wichtig, dass Sie Ihren Arzt über alle von Ihnen eingenommenen Arzneimittel informieren.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Sie müssen Ihrem Arzt oder Apotheker mitteilen, wenn Sie schwanger sind oder schwanger werden möchten, bevor Sie NEXIAM einnehmen. Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Ihr Arzt wird entscheiden, ob Sie NEXIAM während dieses Zeitraums einnehmen dürfen oder nicht.

Es ist nicht bekannt, ob NEXIAM in die Muttermilch übergeht. NEXIAM darf deshalb nicht eingenommen werden, wenn Sie stillen.

### **Bei Einnahme von NEXIAM mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Sie können Ihre Tabletten während der Mahlzeit oder auf nüchternen Magen einnehmen.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es ist wenig wahrscheinlich, dass NEXIAM die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu führen oder Werkzeuge oder Maschinen zu bedienen, beeinflussen wird.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von NEXIAM**

NEXIAM, magensaftresistente Tabletten enthalten Saccharose, ein bestimmte Zucker. Wenn Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt hat, dass Sie bestimmte Zucker nicht vertragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, ehe Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

## **3. WIE IST NEXIAM EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie NEXIAM immer genau nach Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

- NEXIAM, magensaftresistente Tabletten dürfen nie Kindern unter 12 Jahren verabreicht werden;
- Wenn Sie dieses Arzneimittel über einen langen Zeitraum einnehmen, wird Ihr Arzt Sie beobachten müssen (insbesondere, wenn Sie es länger als ein Jahr lang einnehmen);
- Falls Ihr Arzt Ihnen gesagt hat, dass Sie dieses Arzneimittel nach Bedarf einnehmen sollen, informieren Sie ihn, wenn sich Ihre Beschwerden verändern.

### **Einnahme dieses Arzneimittels**

- Sie dürfen Ihre Tabletten zu jeder Tageszeit einnehmen;
- Sie können Ihre Tabletten während der Mahlzeit oder auf nüchternen Magen einnehmen;
- Sie müssen Ihre Tabletten als Ganzes mit einem Glas Wasser einnehmen. Die Tabletten dürfen nicht gekaut oder zerbrochen werden. Der Grund dafür ist, dass die Tabletten mit Kügelchen umhüllt sind, die vorbeugen, dass das Medikament von der Magensäure abgebaut wird. Es ist wichtig, dass die Kügelchen nicht beschädigt werden.

### **Was müssen Sie tun, wenn Sie Probleme haben, die Tabletten zu schlucken?**

- Falls Sie Probleme haben, die Tabletten zu schlucken:
  - Legen Sie diese in ein Glas Wasser ohne Kohlensäure. Verwenden Sie keine anderen Flüssigkeiten;
  - Rühren Sie solange, bis die Tabletten auseinander fallen (Sie bemerken, dass Sie keine klare Lösung bekommen). Das Glas kann unmittelbar oder innerhalb einer halben Stunde ausgetrunken werden. Rühren Sie immer um, kurz bevor das Glas getrunken wird;
  - Spülen Sie das Glas halbvoll mit Wasser und trinken Sie es aus, damit Sie sicher sind, das vollständige Arzneimittel eingenommen zu haben. Die festen Teilchen im Glas enthalten das Arzneimittel. Diese sollen weder gekaut noch zerbrochen werden;
- wenn Sie überhaupt nicht schlucken können, kann die Tablette in etwas Wasser aufgelöst und in eine Spritze gefüllt werden. Diese kann Ihnen dann über eine Sonde direkt in den Magen verabreicht werden (Magensonde).

### **Wie viel einnehmen?**

- Ihr Arzt verordnet, wie viele Tabletten Sie einnehmen und wie lange. Dies hängt ab von Ihrer Kondition, Ihrem Alter und der Wirkung Ihrer Leber;
- die üblichen Dosen werden unten angegeben.

### **Behandlung von Sodbrennen aufgrund der gastroösophagealen Refluxkrankheit (GERD)**

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren

- Wenn Ihr Arzt feststellt, dass Ihre Speiseröhre leicht angegriffen ist, ist die übliche Dosis eine magensaftresistente Tablette NEXIAM 40 mg einmal pro Tag im Laufe von 4 Wochen. Ihr Arzt kann Ihnen verschreiben, dieselbe Dosis weitere 4 Wochen einzunehmen, wenn Ihre Speiseröhre noch nicht geheilt ist.
- Wenn Ihre Speiseröhre geheilt ist, ist die übliche Dosis eine magensaftresistente Tablette NEXIAM 20 mg einmal pro Tag.
- Wenn Ihre Speiseröhre nicht angegriffen ist, ist die übliche Dosis eine magensaftresistente Tablette NEXIAM 20 mg pro Tag. Sobald die Erkrankung kontrolliert ist, sagt Ihnen Ihr Arzt möglicherweise, dass Sie Ihr Medikament nach Bedarf einnehmen sollen, bis zu eine magensaftresistente Tablette NEXIAM 20 mg täglich.
- Wenn Sie ernsthafte Leberprobleme haben, kann Ihr Arzt Ihnen eine geringere Dosis verschreiben.

#### **Behandlung von Geschwüren, die durch Infektionen mit *Helicobacter pylori* verursacht wurde, und deren Vorbeugung**

- Erwachsene ab 18 Jahren: die übliche Dosis ist eine magensaftresistente Tablette NEXIAM 20 mg zweimal pro Tag während einer Woche;
- Ihr Arzt verschreibt Ihnen außerdem die Antibiotika Amoxicillin und Clarithromycin.

#### **Heilung von Magengeschwüren, die auf eine Behandlung mit NSAID (nicht-steroidale Entzündungshemmer) zurückzuführen sind**

- Erwachsene ab 18 Jahren: die übliche Dosis ist eine magensaftresistente Tablette NEXIAM 20 mg einmal pro Tag während 4 bis 8 Wochen.

#### **Vorbeugen von Magengeschwüren, die auf eine NSAID-Behandlung (nicht-steroidale Entzündungshemmer) zurückzuführen sind**

- Erwachsene ab 18 Jahren: die übliche Dosis ist eine magensaftresistente Tablette NEXIAM 20 mg einmal pro Tag.

#### **Behandlung einer erhöhten Azidität des Magens zurückzuführen auf ein Geschwür in Höhe des Pankreas (Zollinger-Ellison-Syndrom)**

- Erwachsene ab 18 Jahren: die übliche Dosis ist NEXIAM 40 mg zweimal pro Tag;
- Ihr Arzt stimmt Ihre Dosis auf Ihren Bedarf ab und verordnet außerdem, wie lange Sie das Medikament einnehmen müssen. Die Höchstdosis beträgt 80 mg zweimal pro Tag.

#### **Fortsetzung der Behandlung nach Prävention einer Rezidivblutung von Ulzera mit intravenösem NEXIAM**

- Die übliche Dosis ist eine Tablette NEXIAM 40 mg einmal täglich über 4 Wochen.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von NEXIAM eingenommen haben, als Sie sollten**

Wenn Sie mehr NEXIAM eingenommen haben, als Ihr Arzt Ihnen verschrieben hat, müssen Sie sich sofort an Ihren Arzt oder Apotheker wenden oder mit dem *Giftnotrufzentrale (070/245 245)* Kontakt aufnehmen.

#### **Wenn Sie die Einnahme von NEXIAM vergessen haben**

- falls Sie vergessen haben, eine Dosis einzunehmen, müssen Sie diese Dosis einnehmen so bald Sie daran denken. Wenn es allerdings fast Zeit ist, die nächste Dosis einzunehmen, lassen Sie die vergessene Dosis aus.
- nehmen Sie nicht die doppelte Dosis zum selben Zeitpunkt ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

## **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann NEXIAM Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen bei sich bemerken, beenden Sie die Einnahme von NEXIAM und wenden Sie sich umgehend an einen Arzt:**

- plötzliche Atemschwierigkeiten, Anschwellung der Lippen, der Zunge und des Halses oder am Körper, einen Hautausschlag, Ohnmacht oder Probleme mit dem Schlucken (eine schwerwiegende allergische Reaktion);
- Hautrötung mit Blasenbildung oder Ablösen der Haut. Es können auch schwerwiegende Blasenbildung und Blutungen an den Lippen, den Augen, dem Mund, der Nase und den Genitalien auftreten. Dies könnte auf ein „Stevens-Johnson Syndrom“ oder eine „toxische epidermale Nekrolyse“ hinweisen;
- Gelbfärbung der Haut, dunkler Urin und Müdigkeit können Symptome von Leberproblemen sein.

Diese Nebenwirkungen sind selten und treten bei weniger als 1 von 1.000 Patienten auf.

Andere mögliche Nebenwirkungen:

***Häufig (bei weniger als 1 von 10 Patienten)***

- Kopfschmerzen.
- Erkrankungen des Magen oder Darms: Durchfall, Bauchschmerzen, Verstopfung, geblähtes Gefühl (Flatulentia).
- Nausea oder Erbrechen.

***Gelegentlich (bei weniger als 1 von 100 Patienten)***

- Schwellung von Füßen und Knöcheln.
- Schlafstörungen (Schlaflosigkeit).
- Schwindligkeit, Kribbeln, Schläfrigkeit.
- Schwindel (Vertigo).
- Trockener Mund.
- Veränderungen von Blutwerten, mit denen kontrolliert wird, wie Ihre Leber arbeitet.
- Hautausschlag, Urtikaria und Juckreiz.

***Selten (bei weniger als 1 von 1 000 Patienten)***

- Erkrankungen des Bluts wie Verringerung der Anzahl der weißen Blutkörperchen oder der Blutplättchen. Das kann zu Schwäche und Ekchymosen führen und Infektionen wahrscheinlicher machen.
- Absenkung des Natriumspiegels im Blut, was zu Schwäche, Erbrechen und Krämpfen führen kann.
- Erregung, Verwirrtheit oder Depression.
- Geschmacksstörungen.
- Sehstörungen, wie trübe Sicht.
- Plötzliche pfeifende Atmung oder Kurzatmigkeit (Bronchospasmus).
- Entzündung der Mundschleimhaut.
- Entzündung, die als „Soor“ bezeichnet wird und den Darm betreffen kann und von einem Pilz hervorgerufen wird.
- Leberprobleme einschließlich Gelbsucht, die eine Gelbfärbung der Haut, dunklen Urin und Müdigkeit hervorrufen kann.
- Haarausfall (Alopezie).
- Hautausschlag bei Sonnenlichtexposition.
- Gelenk- (Arthralgie) oder Muskelschmerzen (Myalgie).
- Generelles Unwohlsein und Energiemangel.
- Vermehrtes Schwitzen.

***Sehr selten (bei weniger als 1 von 10 000 Patienten)***

- Veränderung der Anzahl der Blutzellen, Agranulozytose einschließlich (Mangel an weißen Blutkörperchen).
- Aggressivität.
- Dinge sehen, fühlen und hören, die nicht real sind (Halluzinationen).
- Schwerwiegende Leberstörungen, die zu einer Leberinsuffizienz und Gehirnentzündung führen können.
- Plötzliches Auftreten schwerwiegender Hautausschläge oder Blasen oder eines Abschilfern der Haut. Sie können mit hohem Fieber und Gelenkschmerzen einhergehen (Erythema multiforme, Stevens-Johnson-Syndrom, toxische epidermale Nekrolyse).
- Muskelschwäche.
- Ernsthafte Nierenprobleme.
- Vergrößerung der Brüste beim Mann.
- Verminderte Magnesiumkonzentration im Blut. Dieses kann Schwäche, Übelkeit (Erbrechen), Krämpfe, Zittern und Arrhythmien (Herzrhythmusstörungen) verursachen.

NEXIAM kann in sehr seltenen Fällen die weißen Blutkörperchen beeinträchtigen und zu einem Immundefizit führen. Sie müssen sich baldmöglichst an Ihren Arzt wenden, wenn Sie Infektionen haben mit Beschwerden wie Fieber mit einem **stark** reduzierten allgemeinen Gesundheitszustand oder Fieber mit Symptomen einer lokalen Infektion wie Schmerzen in Hals, Rachen, Mund oder Schwierigkeiten beim Wasserlassen, da ein Mangel an weißen Blutkörperchen (Agranulozytose) durch einen Bluttest diagnostiziert werden kann. Sie müssen Ihren Arzt in diesem Fall unbedingt über Ihre Medikation informieren.

Machen Sie sich über diese Liste der möglichen Nebenwirkungen keine Sorgen, es ist möglich, dass Sie unter keiner dieser Nebenwirkungen leiden. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## 5. WIE IST NEXIAM AUFZUBEWAHREN?

- Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nicht über 30°C lagern.
- Das Arzneimittel in der Originalverpackung aufbewahren (Blister) oder die Verpackung fest verschlossen halten (Flasche), um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton, dem Brieftaschenetui oder der Blisterfolie nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.
- Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

### Was NEXIAM enthält

- Der Wirkstoff ist: Esomeprazol. NEXIAM, magensaftresistente Tabletten sind in zwei Stärken, die 20 mg oder 40 mg Esomeprazol enthalten (als Magnesium-Trihydratsalz), verfügbar.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Glycerolmonostearat 40-55, Hypromellose, Hypromellose, Eisenoxid (rötlichbraun, gelb) (E172, nur 20 mg Tablette), Magnesiumstearat, 30%ige Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer-(1:1)-Dispersion, mikrokristalline Zellulose, synthetisches Paraffin, Makrogol, Polysorbat 80, Krospondon, Natriumstearyl fumarat, Zucker-Stärke-Pellets (Saccharose und Maisstärke), Talkum, Titandioxid (E171), Triethylzitat.

### Wie NEXIAM aussieht und Inhalt der Packung

- NEXIAM 20 mg, magensaftresistente Tabletten sind leichtrosa, auf der eine Seite mit <sup>A</sup>EH graviert und auf der anderen Seite mit 20 mg.
- NEXIAM 40 mg, magensaftresistente Tabletten sind rosa, auf der eine Seite mit <sup>A</sup>EI graviert und auf der anderen Seite mit 40 mg.
- Ihre Tabletten sind erhältlich in Blisterpackung in Brieftaschenetui und/oder in einem Karton mit
  - 20 mg, 40 mg: Flaschen mit 2, 5, 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 100, 140 (5x28) Tabletten;
  - 20 mg, 40 mg: Blisterpackungen in Brieftaschenetui und/oder in einem Karton mit 3, 7, 7x1, 14, 15, 25x1, 28, 30, 50x1, 56, 60, 90, 98, 100x1, 140 Tabletten.
 Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

### **Pharmazeutischer Unternehmer**

NV AstraZeneca SA  
 Egide Van Ophemstr. 110  
 B-1180 Brüssel  
 Belgien  
 Tel. +32 (0)2/370 48 11

### **NEXIAM wird freigegeben durch**

AstraZeneca AB, Gärtunavägen, S-151 85, Södertälje, Schweden  
 AstraZeneca AB, Mariehemsvägen 8, SE-906 54 Umeå, Schweden  
 AstraZeneca UK Ltd, Charter Way SK102NA Macclesfield, Cheshire, Großbritannien  
 AstraZeneca GmbH, Tinsdaler Weg 183, Wedel 22880, Deutschland  
 Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse, Plankstadt 68723, Deutschland  
 AstraZeneca Reims, Parc Industriel Pompelle Chemin de Vrilly 1050, Reims 51689, Frankreich  
 Recipharm Monts, Usine de Monts, Rue de Montbazon 18, Monts 37260, Frankreich  
 Biofabri, S.L., La Relva s/n, 36400 Porriño, Pontevedra, Spanien

### **Zulassungsnummern**

NEXIAM 20 mg, magensaftresistente Tabletten (Blisterpackung): BE215826  
 NEXIAM 20 mg, magensaftresistente Tabletten (Flasche): BE215792  
 NEXIAM 40 mg, magensaftresistente Tabletten (Blisterpackung): BE215887  
 NEXIAM 40 mg, magensaftresistente Tabletten (Flasche): BE215853

### **Verkaufsabgrenzung**

Verschreibungspflichtig.

### **Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen**

Nexium mups	Deutschland, Spanien
Nexium	Österreich, Dänemark, Finnland, Griechenland, Irland Island, Italien, Norwegen, Niederlande, Portugal, Großbritannien, Schweden
Nexiam	Belgien, Luxemburg
Inexium	Frankreich

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 04/2011.**