

## Prospecto: información para el usuario

### ACARIZAX 12 SQ-HDM liofilizado oral

Para uso en adultos

Extracto alergénico estandarizado de ácaros del polvo doméstico  
(*Dermatophagoides pteronyssinus* y *Dermatophagoides farinae*)

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Puede contribuir comunicando los efectos adversos que pudiera usted tener. La parte final de la sección 4 incluye información sobre cómo comunicar estos efectos adversos.

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

### Contenido del prospecto

1. Qué es ACARIZAX y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar ACARIZAX
3. Cómo tomar ACARIZAX.
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de ACARIZAX
6. Contenido del envase e información adicional

#### 1. Qué es ACARIZAX y para qué se utiliza

ACARIZAX contiene un extracto alergénico de ácaros del polvo doméstico. Se presenta en una forma conocida como liofilizado oral, el cual es semejante a un comprimido, pero mucho más blando y se absorbe en el organismo al colocarlo debajo de la lengua.

ACARIZAX se usa para tratar la rinitis alérgica (inflamación de las membranas de la nariz) y el asma alérgica asociada, causada por ácaros del polvo doméstico en adultos (18-65 años de edad). ACARIZAX actúa aumentando la tolerancia inmunológica (la capacidad de su cuerpo a actuar) frente a los ácaros del polvo doméstico. Puede ser necesario que tenga que tomar el tratamiento durante 8 a 14 semanas para que note alguna mejoría.

El médico comprobará sus síntomas alérgicos y le realizará una prueba cutánea de prick y/o le tomará una muestra de sangre para determinar si ACARIZAX es el tratamiento adecuado para usted.

Se debe tomar la primera dosis de ACARIZAX bajo supervisión médica. Debe permanecer en observación durante al menos media hora tras la toma de la primera dosis. Esto es una precaución que hay que tomar

para observar su sensibilidad a este medicamento. Además le dará la posibilidad de comunicar a su médico cualquier posible efecto adverso que esté sufriendo.

ACARIZAX es recetado por médicos especialistas en el tratamiento de la alergia.

## **2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar ACARIZAX**

### **No tome ACARIZAX:**

- si es alérgico a cualquiera de los excipientes (otros componentes) de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- si su función pulmonar es pobre (diagnosticada por su médico).
- si ha sufrido un empeoramiento grave de su asma durante los últimos tres meses (diagnosticado por su médico).
- si el día que debe tomar la primera dosis de ACARIZAX padece asma y una infección en curso de las vías respiratorias, como un resfriado común, irritación de garganta o neumonía. Su médico retrasará el comienzo de su tratamiento hasta que se mejore.
- si padece una enfermedad que afecta a su sistema inmunitario; está tomando medicamentos que suprimen el sistema inmunitario o tiene cáncer.
- si se ha sometido recientemente a una extracción dental, o cualquier otra intervención en la boca, o tiene úlceras o infecciones en la boca. Su médico podría recomendarle retrasar el comienzo del tratamiento o interrumpir el tratamiento hasta que se le haya curado la boca.

### **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico antes de empezar a tomar ACARIZAX:

- si está siendo tratado de depresión con antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAOs), o con inhibidores de la COMT para la enfermedad de Parkinson.
- si ha sufrido previamente una reacción alérgica grave a una inyección de un extracto alérgico de ácaros del polvo doméstico.
- si tiene alergia al pescado. ACARIZAX puede contener trazas de proteínas de pescado. Los datos disponibles no indican que haya un mayor riesgo de sufrir una reacción alérgica en pacientes alérgicos al pescado.
- si sufre síntomas alérgicos severos, como dificultad para tragar o respirar, cambios en la voz, hipotensión (presión arterial baja), o tiene sensación de tener un nudo en la garganta. Interrumpa el tratamiento y contacte con su médico inmediatamente.
- si sus síntomas asmáticos empeoran más de lo normal. Interrumpa el tratamiento y contacte con su médico inmediatamente.

Si padece asma, debe continuar usando su medicación habitual para el asma mientras comienza el tratamiento con ACARIZAX. Su médico le indicará como reducir su medicación para el asma de manera gradual a lo largo del tiempo.

Si sufriera un dolor en el pecho persistente o dificultad al tragar, póngase en contacto con su médico.

Puede esperar sufrir alguna reacción alérgica local, de leve a moderada, durante su tratamiento. Sin embargo, si fuera grave, hable con su médico por si necesitara tomar alguna medicación antialérgica, como un antihistamínico.

### **Niños y adolescentes**

ACARIZAX no está indicado en niños o adolescentes.

### **Toma de ACARIZAX con otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los medicamentos que se pueden adquirir sin receta. Si está tomando otros medicamentos para sus síntomas alérgicos como antihistamínicos, medicamentos para aliviar el asma, o esteroides, dígaselo a su médico para que pueda aconsejarle acerca de su uso mientras se trata con ACARIZAX. Si deja de tomar estos medicamentos para sus síntomas alérgicos puede experimentar más efectos adversos a ACARIZAX.

### **Toma de ACARIZAX con alimentos y bebidas**

No coma ni beba durante los 5 minutos siguientes a la toma de este medicamento.

### **Embarazo y lactancia**

Actualmente no hay experiencia sobre el uso de ACARIZAX en el embarazo. No se debe iniciar el tratamiento con ACARIZAX durante el embarazo. Si se quedara embarazada durante el tratamiento, consulte con su médico si es apropiado para usted continuar con él.

Actualmente no hay experiencia sobre el uso de ACARIZAX durante la lactancia. Sin embargo, no se prevén efectos en el lactante. Consulte con su médico si puede continuar tomando ACARIZAX durante la lactancia.

### **Conducción y uso de máquinas**

La influencia del tratamiento con ACARIZAX sobre la capacidad para conducir o utilizar máquinas es nula o despreciable.

Sin embargo, sólo usted puede juzgar si está afectando a sus capacidades. Por lo tanto, lea toda la información contenida en este prospecto, especialmente la sección 4 “Posibles efectos adversos” y en caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico.


## **3. Cómo tomar ACARIZAX**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.


La dosis habitual es de un liofilizado al día. Su médico le indicará durante cuanto tiempo debe tomar ACARIZAX.

### **Uso en adultos**


Asegúrese de que sus manos están secas antes de tocar este medicamento. Tome el medicamento de la siguiente forma:




1. Desprenda la tira marcada con triángulos en la parte superior del envase.




2. Separe una unidad del envase siguiendo las líneas perforadas.



3. No presione el medicamento para sacarlo a través del aluminio. Podría dañarlo, ya que se rompe con facilidad. En vez de eso, doble la esquina marcada de la lámina de aluminio y tire de ella.



4. Saque cuidadosamente el medicamento de la unidad y tómelo inmediatamente.



5. Coloque el medicamento bajo la lengua. Deje que se disuelva ahí durante unos segundos. No trague durante el primer minuto. Espere por lo menos 5 minutos antes de comer o beber.

#### Uso en niños y adolescentes

ACARIZAX no está indicado en niños o adolescentes.

**Si toma más ACARIZAX del que debe**

Si ha tomado demasiados liofilizados puede presentar síntomas alérgicos, incluyendo síntomas locales en la boca y la garganta. Si experimenta síntomas graves, contacte inmediatamente con su médico u hospital.

**Si olvidó tomar ACARIZAX**

Si olvidó tomar una dosis, tómela más tarde en el día. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si olvidó tomar ACARIZAX durante más de 7 días, deberá contactar con su médico antes de volver a tomar ACARIZAX.

**Si interrumpe el tratamiento con ACARIZAX**

Si no toma este medicamento tal y como se lo han recetado, puede que no se beneficie de todos los efectos del tratamiento.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

**4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Los efectos adversos pueden ser una respuesta alérgica frente al alérgeno con el que se está tratando. La mayoría de los efectos adversos duran entre minutos y horas después de tomar el medicamento, y la mayoría remitirán cuando lleve 1-3 meses de tratamiento.

Deje de tomar ACARIZAX y contacte inmediatamente con su médico u hospital si sufre algunos de los siguientes síntomas:

- Empeoramiento del asma existente
- Hinchazón de aparición rápida de la cara, boca o garganta
- Dificultad al tragar
- Dificultad al respirar
- Cambios en la voz
- Hipotensión (presión arterial baja)
- Sensación de llenado en la garganta (como hinchada)
- Habones y picor de piel

Otros posibles efectos adversos:

Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas):

- Sensación de irritación en la garganta
- Hinchazón en la boca y los labios
- Picor en la boca y los oídos
- Infección de la vías respiratorias

Frecuentes (pueden afectar hasta a 1 de cada 10 personas):

- Sensación de hormigueo o entumecimiento en la boca o la lengua
- Picor o inflamación en los ojos
- Picor en la lengua o los labios
- Hinchazón en la lengua o garganta
- Inflamación, molestias o sensación de quemazón en la boca
- Enrojecimiento en la boca o úlceras en la boca
- Dolor en la boca
- Alteración del gusto
- Dolor de estómago o malestar
- Diarrea
- Malestar (náuseas) y vómitos
- Dolor al tragar
- Síntomas de asma
- Falta de aire
- Dolor en el pecho
- Indigestión y ardor de estómago
- Ronquera
- Cansancio
- Habones y picor en la piel

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):

- Reacción alérgica grave
- Hinchazón de aparición rápida de la cara o la piel
- Sensación de latidos cardiacos rapidos y fuertes o irregulares
- Molestia en el oído
- Opresión en la garganta
- Dificultad al tragar
- Molestias en la nariz, congestión o goteo nasal, estornudos
- Ampollas en la boca
- Irritación en el esófago
- Sensación de cuerpo extraño en la garganta
- Mareo
- Malestar general
- Boca seca
- Sensación de hormigueo en la piel
- Enrojecimiento de la garganta
- Aumento de tamaño de las amígdalas
- Dolor de labio
- Úlcera en el labio
- Hipersecreción de las glándulas salivales
- Enrojecimiento de la piel

Raras (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas):

- Aumento de tamaño de las glándulas salivales

Si alguno de los efectos adversos le preocupa o le está causando dificultades, debe contactar con su médico, el cual decidirá si necesita tomar algún medicamento, como los antihistamínicos, que le ayuden a aliviar los efectos adversos que está sufriendo.

## Comunicación de efectos adversos


Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano [www.notificaRAM.es](http://www.notificaRAM.es). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

## 5. Conservación de ACARIZAX

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice ACARIZAX después de la fecha de caducidad que aparece en el blíster y en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## 6. Contenido del envase e información adicional

### Composición de ACARIZAX

- El principio activo es un extracto alergénico estandarizado de ácaros del polvo doméstico, *Dermatophagoides pteronyssinus* y *Dermatophagoides farinae*. La actividad por liofilizado oral se expresa en unidades SQ-HDM. La actividad de un liofilizado oral es de 12 SQ-HDM.
- Los demás componentes son gelatina (procedente de pescado), manitol e hidróxido sódico.

### Aspecto del producto y contenido del envase

Liofilizado oral redondo, de color blanco o blanquecino, con un grabado en una de las caras.

Blísters de aluminio, con una de las láminas desplegable, envasados en una caja de cartón. Cada blíster contiene 10 liofilizados orales.

Envases disponibles: 10, 30 y 90 liofilizados orales.

Puede que no estén comercializados todos los tamaños de envases.

### Titular de la autorización de comercialización

ALK-Abelló A/S  
Bøge Allé 6-8  
DK-2970 Hørsholm  
Dinamarca.

### Responsable de la fabricación

ALK-Abelló. S.A.  
C/ Miguel Fleeta, 19  
28037 – Madrid  
España

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización:

ALK-Abelló. S.A.  
C/ Miguel Fleta, 19  
28037 – Madrid.

**Fecha de la última revisión de este prospecto: 04/2017**

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

<http://www.aemps.gob.es/>.