

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a Vd. personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aún cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

En este prospecto:

1. Qué es PROPECIA 1 mg comprimidos recubiertos con película y para qué se utiliza
2. Antes de tomar PROPECIA 1 mg comprimidos recubiertos con película
3. Cómo tomar PROPECIA 1 mg comprimidos recubiertos con película
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de PROPECIA 1 mg comprimidos recubiertos con película

PROPECIA® 1 mg comprimidos recubiertos con película
(finasterida)

PROPECIA es para uso exclusivo en varones.

Cada comprimido contiene como principio activo 1 mg de finasterida.

Los demás excipientes son lactosa monohidrato (110,4 mg), celulosa microcristalina, almidón pregelatinizado, glicolato sódico de almidón, docusato sódico, estearato de magnesio, talco, hipromelosa, hidroxipropil celulosa, dióxido de titanio (color E171), óxido férrico amarillo y rojo (color E172).

Titular:

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.
C/ Josefa Valcárcel, 38
28027 MADRID

Responsable de la fabricación:

MERCK SHARP & DOHME, Ltd.
Shotton Lane
Cramlington
Northumberland, NE23 3JU
UNITED KINGDOM

1. QUÉ ES PROPECIA 1 mg comprimidos recubiertos con película Y PARA QUÉ SE UTILIZA

PROPECIA se presenta en envase de 28 comprimidos recubiertos conteniendo cada uno 1 mg de finasterida.

PROPECIA bloquea una enzima (la 5-alfa reductasa de Tipo 2) que interviene en la regulación del folículo piloso.

Su médico le ha recetado PROPECIA porque sufre usted una pérdida de cabello de tipo masculino (también conocida como alopecia androgenética).

PROPECIA es para uso exclusivo en varones.

2. ANTES DE TOMAR PROPECIA 1 mg comprimidos recubiertos con película

Los hombres con pérdida de pelo leve a moderada, pero no completa, pueden esperar beneficiarse del uso de PROPECIA. En las mujeres en las que se estudió, PROPECIA no fue efectivo en el tratamiento de la pérdida de pelo (alopecia androgenética).

Informe a su médico de sus problemas médicos actuales y pasados, y de cualquier alergia que haya sufrido.

No es necesario que cambie su forma habitual de cuidar su cabello.

No tome PROPECIA:

- si cree que es alérgico a cualquiera de sus componentes.
- si tiene problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, intolerancia a la lactosa Lapp o absorción insuficiente de glucosa-galactosa.

Las mujeres no pueden utilizar PROPECIA (véase: Embarazo).

Los niños no deben tomar PROPECIA.

Toma de PROPECIA con alimentos y bebidas:

PROPECIA se puede tomar con o sin alimentos.

Embarazo:

PROPECIA está destinado al tratamiento de la pérdida de pelo de tipo masculino exclusivamente en varones. **Las mujeres no pueden usar PROPECIA debido al riesgo en el embarazo. Las mujeres que estén o puedan estar embarazadas tampoco deben manipular comprimidos aplastados o rotos de PROPECIA.** Si una mujer embarazada con un feto masculino absorbe el componente activo de PROPECIA tras haberlo ingerido por vía oral o a través de la piel, su hijo podría nacer con anomalías de los órganos sexuales. Si una mujer embarazada entra en contacto con el principio activo de PROPECIA, debe consultar a un médico. Los comprimidos de PROPECIA están recubiertos para evitar el contacto con el componente activo durante la manipulación normal, siempre y cuando los comprimidos no estén rotos ni aplastados.

En caso de duda, pregunte a su médico.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

Conducción y uso de máquinas:

PROPECIA no afecta a la capacidad para conducir vehículos o manejar maquinaria.

Toma de otros medicamentos:

Habitualmente, PROPECIA no interfiere con otros medicamentos.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento - incluso los adquiridos sin receta médica.

3. CÓMO TOMAR PROPECIA 1 mg comprimidos recubiertos con película

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Recuerde tomar su medicamento.

Tome un comprimido de PROPECIA cada día, con o sin alimentos. Siga el consejo de su médico.

- PROPECIA no actuará más rápido ni mejor por tomar más de un comprimido al día. Sólo deberá tomar un comprimido de PROPECIA al día.
- Su médico le ayudará a determinar si PROPECIA da resultados en su caso. Es importante tomar PROPECIA durante todo el tiempo que su médico le indique. PROPECIA sólo actúa a largo plazo si se mantiene su administración.
- La pérdida de pelo de tipo masculino es un cuadro que se desarrolla a lo largo de mucho tiempo. En general, para que comience a apreciar el aumento en la densidad del pelo o la prevención de una mayor caída, puede ser necesario tomar el medicamento diariamente durante 3 a 6 meses o más.

- Se recomienda el uso continuo de PROPECIA para mantener el beneficio.

Si deja de tomar PROPECIA, probablemente perderá el pelo que haya ganado en los 9 a 12 meses siguientes a la interrupción del tratamiento.

Trate de tomar PROPECIA de la forma indicada por su médico. Sin embargo, si omite una dosis, no tome una dosis extra. Simplemente tome el comprimido siguiente como de costumbre.

Si estima que la acción de PROPECIA es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si Ud. toma más PROPECIA del que debiera:

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: (91) 562 04 20. Además, debe avisar a su médico de inmediato.

Si olvidó tomar PROPECIA:

Si olvida una dosis, límitese a reanudar el régimen habitual de un comprimido una vez al día. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, PROPECIA puede tener efectos adversos. Son raros y no afectan a la mayoría de los varones.

Sólo un número pequeño de varones pueden experimentar menos deseo sexual y/o tener dificultades para lograr la erección. Un pequeño número puede tener problemas con la eyaculación, incluyendo una disminución de la cantidad de semen eyaculado durante las relaciones sexuales (no parece que este efecto interfiera en la función sexual normal). En los estudios clínicos, estas reacciones adversas desaparecieron en los varones que dejaron de tomar PROPECIA y en muchos de los que continuaron el tratamiento.

En el uso general, se han comunicado raramente las siguientes reacciones adversas: reacciones alérgicas incluyendo erupción, picor, ronchas e hinchazón de los labios y la cara; sensibilidad y aumento de la mama; y dolor testicular.

En los estudios clínicos, PROPECIA no afectó al pelo de las demás partes del cuerpo.

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE PROPECIA 1 mg comprimidos recubiertos con película

Mantenga PROPECIA fuera del alcance y de la vista de los niños.

PROPECIA es sensible a la humedad. Conserve PROPECIA en el envase original.

No proporcione sus comprimidos de PROPECIA a nadie.

Caducidad:

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad impresa en el envase.

Este prospecto ha sido aprobado en Marzo de 2004.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a Vd. personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aún cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

En este prospecto:

1. Qué es PROPECIA 1 mg comprimidos recubiertos con película y para qué se utiliza
2. Antes de tomar PROPECIA 1 mg comprimidos recubiertos con película
3. Cómo tomar PROPECIA 1 mg comprimidos recubiertos con película
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de PROPECIA 1 mg comprimidos recubiertos con película

PROPECIA® 1 mg comprimidos recubiertos con película
(finasterida)

PROPECIA es para uso exclusivo en varones.

Cada comprimido contiene como principio activo 1 mg de finasterida.

Los demás excipientes son lactosa monohidrato (110,4 mg), celulosa microcristalina, almidón pregelatinizado, glicolato sódico de almidón, docusato sódico, estearato de magnesio, talco, hipromelosa, hidroxipropil celulosa, dióxido de titanio (color E171), óxido férrico amarillo y rojo (color E172).

Titular:

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.
C/ Josefa Valcárcel, 38
28027 MADRID

Responsable de la fabricación:

MERCK SHARP & DOHME, Ltd.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Holanda

1. QUÉ ES PROPECIA 1 mg comprimidos recubiertos con película Y PARA QUÉ SE UTILIZA

PROPECIA se presenta en envase de 28 comprimidos recubiertos conteniendo cada uno 1 mg de finasterida.

PROPECIA bloquea una enzima (la 5-alfa reductasa de Tipo 2) que interviene en la regulación del folículo piloso.

Su médico le ha recetado PROPECIA porque sufre usted una pérdida de cabello de tipo masculino (también conocida como alopecia androgenética).

PROPECIA es para uso exclusivo en varones.

2. ANTES DE TOMAR PROPECIA 1 mg comprimidos recubiertos con película

Los hombres con pérdida de pelo leve a moderada, pero no completa, pueden esperar beneficiarse del uso de PROPECIA. En las mujeres en las que se estudió, PROPECIA no fue efectivo en el tratamiento de la pérdida de pelo (alopecia androgenética).

Informe a su médico de sus problemas médicos actuales y pasados, y de cualquier alergia que haya sufrido.

No es necesario que cambie su forma habitual de cuidar su cabello.

No tome PROPECIA:

- si cree que es alérgico a cualquiera de sus componentes.
- si tiene problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, intolerancia a la lactosa Lapp o absorción insuficiente de glucosa-galactosa.

Las mujeres no pueden utilizar PROPECIA (véase: Embarazo).

Los niños no deben tomar PROPECIA.

Toma de PROPECIA con alimentos y bebidas:

PROPECIA se puede tomar con o sin alimentos.

Embarazo:

PROPECIA está destinado al tratamiento de la pérdida de pelo de tipo masculino exclusivamente en varones. **Las mujeres no pueden usar PROPECIA debido al riesgo en el embarazo. Las mujeres que estén o puedan estar embarazadas tampoco deben manipular comprimidos aplastados o rotos de PROPECIA.** Si una mujer embarazada con un feto masculino absorbe el componente activo de PROPECIA tras haberlo ingerido por vía oral o a través de la piel, su hijo podría nacer con anomalías de los órganos sexuales. Si una mujer embarazada entra en contacto con el principio activo de PROPECIA, debe consultar a un médico. Los comprimidos de PROPECIA están recubiertos para evitar el contacto con el componente activo durante la manipulación normal, siempre y cuando los comprimidos no estén rotos ni aplastados.

En caso de duda, pregunte a su médico.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

Conducción y uso de máquinas:

PROPECIA no afecta a la capacidad para conducir vehículos o manejar maquinaria.

Toma de otros medicamentos:

Habitualmente, PROPECIA no interfiere con otros medicamentos.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento - incluso los adquiridos sin receta médica.

3. CÓMO TOMAR PROPECIA 1 mg comprimidos recubiertos con película

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Recuerde tomar su medicamento.

Tome un comprimido de PROPECIA cada día, con o sin alimentos. Siga el consejo de su médico.

- PROPECIA no actuará más rápido ni mejor por tomar más de un comprimido al día. Sólo deberá tomar un comprimido de PROPECIA al día.
- Su médico le ayudará a determinar si PROPECIA da resultados en su caso. Es importante tomar PROPECIA durante todo el tiempo que su médico le indique. PROPECIA sólo actúa a largo plazo si se mantiene su administración.
- La pérdida de pelo de tipo masculino es un cuadro que se desarrolla a lo largo de mucho tiempo. En general, para que comience a apreciar el aumento en la densidad del pelo o la prevención de una mayor caída, puede ser necesario tomar el medicamento diariamente durante 3 a 6 meses o más.

- Se recomienda el uso continuo de PROPECIA para mantener el beneficio.

Si deja de tomar PROPECIA, probablemente perderá el pelo que haya ganado en los 9 a 12 meses siguientes a la interrupción del tratamiento.

Trate de tomar PROPECIA de la forma indicada por su médico. Sin embargo, si omite una dosis, no tome una dosis extra. Simplemente tome el comprimido siguiente como de costumbre.

Si estima que la acción de PROPECIA es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si Ud. toma más PROPECIA del que debiera:

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: (91) 562 04 20. Además, debe avisar a su médico de inmediato.

Si olvidó tomar PROPECIA:

Si olvida una dosis, límitese a reanudar el régimen habitual de un comprimido una vez al día. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, PROPECIA puede tener efectos adversos. Son raros y no afectan a la mayoría de los varones.

Sólo un número pequeño de varones pueden experimentar menos deseo sexual y/o tener dificultades para lograr la erección. Un pequeño número puede tener problemas con la eyaculación, incluyendo una disminución de la cantidad de semen eyaculado durante las relaciones sexuales (no parece que este efecto interfiera en la función sexual normal). En los estudios clínicos, estas reacciones adversas desaparecieron en los varones que dejaron de tomar PROPECIA y en muchos de los que continuaron el tratamiento.

En el uso general, se han comunicado raramente las siguientes reacciones adversas: reacciones alérgicas incluyendo erupción, picor, ronchas e hinchazón de los labios y la cara; sensibilidad y aumento de la mama; y dolor testicular.

En los estudios clínicos, PROPECIA no afectó al pelo de las demás partes del cuerpo.

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE PROPECIA 1 mg comprimidos recubiertos con película

Mantenga PROPECIA fuera del alcance y de la vista de los niños.

PROPECIA es sensible a la humedad. Conserve PROPECIA en el envase original.

No proporcione sus comprimidos de PROPECIA a nadie.

Caducidad:

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad impresa en el envase.

Este prospecto ha sido aprobado en Marzo de 2004.