

IMPORTANT: VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR

SANIS
DOXYCYCLINE
Capsules/Comprimés

Le présent dépliant contient des renseignements utiles sur les capsules / comprimés Doxycycline. Veuillez le lire attentivement avant de prendre ce médicament. Si vous avez des questions au sujet de ce médicament ou de votre affection, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

ATTENTION : Ce médicament n'a été prescrit qu'à VOUS SEUL. N'en donnez pas à une autre personne, même si elle présente des symptômes semblables aux vôtres, car ce médicament pourrait lui nuire.

Au sujet des capsules / comprimés Doxycycline

Le nom de ce médicament est Doxycycline. Chaque comprimé contient 100 mg de doxycycline (sous forme d'hydrate), son ingrédient actif, et les ingrédients non médicinaux (inactifs) suivants : AD&C bleu n° 2, AD&C jaune n° 6, AD&C rouge n° 40, cellulose microcristalline, cire de carnauba, dioxyde de titane, glycolate d'amidon sodique, silice colloïdale et stéarate de magnésium.

Chaque capsule contient 100 mg de doxycycline (sous forme d'hydrate), son ingrédient actif, et les ingrédients non médicinaux (inactifs) suivants : AD&C bleu n° 1, cellulose microcristalline, dioxyde de titane, gélatine, glycolate d'amidon sodique, laurylsulfate de sodium et stéarate de magnésium.

Les comprimés Doxycycline sont de couleur orange, ronds et enrobés d'une pellicule. Les capsules Doxycycline, de couleur bleue, ont la forme habituelle d'une capsule.

Les raisons d'utiliser les capsules / comprimés Doxycycline

Votre médecin vous a prescrit les capsules / comprimés Doxycycline pour traiter une infection bactérienne.

Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser les capsules / comprimés NOVO- Doxycycline

Vous ne devez pas prendre les capsules / comprimés Doxycycline si :

- vous êtes allergique à l'un des ingrédients mentionnés au début du dépliant ;
- vous souffrez de myasthénie grave (une maladie neuromusculaire auto-immune chronique qui cause une faiblesse musculaire).

Avant de prendre les capsules / comprimés Doxycycline

AVANT de prendre ce médicament, informez votre médecin si :

- vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir.
- vous allaitez ou avez l'intention de le faire. L'emploi des capsules / comprimés Doxycycline n'est pas recommandé chez les femmes qui allaitent car la tétracycline peut passer dans le lait maternel.
- Ce médicament a été prescrit à votre enfant et il est âgé de moins de 8 ans. L'emploi des capsules / comprimés Doxycycline n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 8 ans.
- vous avez ou avez connu d'autres problèmes de santé, en particulier :
 - vous avez de la difficulté à avaler, ou avez un rétrécissement ou une obstruction de l'œsophage (le conduit qui relie la bouche à l'estomac)
 - vous prenez d'autres médicaments, y compris ceux que vous achetez sans ordonnance dans une pharmacie, un supermarché ou une boutique d'aliments santé.

Interactions avec les capsules / comprimés Doxycycline

- Il ne faut pas prendre les capsules / comprimés Doxycycline avec de l'alcool, des barbituriques, de la phénytoïne ou de la carbamazépine.

Certains médicaments sont susceptibles d'interagir avec les capsules / comprimés Doxycycline. Si vous prenez les médicaments ci-dessous, votre médecin décidera peut-être d'en modifier la posologie ou le mode d'emploi, ou encore de les remplacer par un autre :

- anticoagulants oraux ;
- pénicilline ;
- subsalicylate de bismuth ;
- antiacides contenant de l'aluminium, du calcium ou du magnésium ; ces agents nuisent à l'absorption de Doxycycline et ne doivent donc pas être pris en même temps.
- produits qui contiennent du fer ; il est préférable de ne pas les prendre en même temps que Doxycycline.
- contraceptifs oraux ; Doxycycline peut en diminuer l'efficacité.

Comme prendre les capsules / comprimés Doxycycline

Les antibiotiques, y compris les capsules / comprimés Doxycycline, ne doivent être utilisés que pour traiter les infections bactériennes. Ils ne sont pas efficaces contre les infections virales (p. ex. le rhume). Même si vous pourriez vous sentir mieux dès les premiers jours du traitement, il est important de continuer à prendre le médicament comme on vous l'a indiqué. Si vous ne prenez pas certaines doses ou que vous ne suivez pas le traitement jusqu'à la fin, vous risquez : (1) de réduire l'efficacité du traitement dans l'immédiat, et (2) d'augmenter la probabilité que la bactérie devienne résistante et ne puisse plus être éliminée par les capsules / comprimés Doxycycline ou d'autres antibiotiques dans le futur.

Suivez fidèlement les instructions de votre médecin en ce qui concerne les doses de capsules / comprimés Doxycycline que vous devez prendre et le moment où vous devez les prendre.

Il est préférable de prendre les capsules / comprimés Doxycycline avec de la nourriture.

Quand prendre les capsules / comprimés NOVO- Doxycycline

Sous forme de comprimés ou de capsules, il faut prendre Doxycycline au repas, ou après, avec un grand verre d'eau, pour prévenir les irritations ou une ulcération de l'œsophage (le conduit qui relie la bouche à l'estomac). Demeurez en position verticale (debout ou assis le dos droit), et ne vous allongez pas pendant ou moins 1 à 2 heures, pour éviter une irritation directe de l'œsophage.

Dose oubliée

Si vous oubliez de prendre votre médicament à l'heure prévue, prenez-le dès que possible à moins que ce soit presque le temps de prendre la dose suivante. Dans ce cas, omettez la dose manquée et reprenez votre horaire habituel. Ne prenez jamais deux doses à la fois.

Surdosage

Il ne faut pas prendre plus de comprimés ou de capsules que ce que votre médecin vous a prescrit. En cas contraire, appelez immédiatement votre médecin, votre pharmacien, le Centre antipoison de votre région, ou rendez-vous au service d'urgence le plus près.

Utilisation appropriée des capsules / comprimés Doxycycline

- Suivez à la lettre les recommandations du médecin.
- Si vous devenez enceinte pendant le traitement, cessez immédiatement de prendre les capsules / comprimés Doxycycline et consultez votre médecin.
- Avant de prendre tout autre médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien que vous prenez Doxycycline en capsules ou en comprimés.
- Continuez à prendre votre médicament comme le médecin vous l'a indiqué, même si vous vous sentez mieux.
- N'utilisez pas les capsules / comprimés Doxycycline pour traiter un autre problème médical à moins d'avis contraire de votre médecin.

Effets secondaires des capsules / comprimés Doxycycline et mesures à prendre

L'emploi des capsules / comprimés Doxycycline peut causer des effets secondaires, mais ils sont en général mineurs et passagers. Cependant, certains effets pourraient être plus graves et nécessiter une intervention médicale. L'emploi des capsules / comprimés Doxycycline peut causer les effets secondaires suivants : nausées, vomissements, diarrhée, perte d'appétit, douleurs abdominales, douleur en avalant ou difficulté à avaler, changement de couleur des dents, éruptions cutanées.

L'emploi des capsules / comprimés Doxycycline peut augmenter la fréquence des candidoses vaginales (infections). Il peut aussi causer une hypertension intracrânienne (pression sanguine élevée dans le cerveau). Des réactions de photosensibilité et des coups de soleil ont été signalés chez certaines personnes traitées par des tétracyclines. Si vous prévoyez être exposé directement à la lumière du soleil, appliquez un écran solaire ou prenez d'autres mesures pour vous protéger. Évitez toute exposition excessive au soleil ou aux rayons ultraviolets artificiels. En cas de réaction phototoxique (p. ex. éruption cutanée), cessez de prendre votre médicament.

Si vous remarquez l'un des effets secondaires suivants lors de la prise de ce médicament, communiquez sans attendre avec votre médecin ou votre pharmacien :

- diarrhée, diarrhée aqueuse ou présence de sang dans les selles, accompagnées ou non de crampes à l'estomac et de fièvre ; en pareil cas, communiquez le plus rapidement possible avec votre médecin.

Si vous remarquez un effet inhabituel, quel qu'il soit, pendant le traitement par les capsules / comprimés Doxycycline, communiquez sans délai avec votre médecin ou votre pharmacien, même si vous pensez qu'il n'y a pas de lien entre cet effet et le médicament, ou que cet effet ne figure pas sur la liste des effets énumérés dans ce dépliant.

Comment conserver les capsules / comprimés Doxycycline

Conservez les flacons entre 15 °C et 30 °C, à l'abri de la lumière.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage et l'étiquette.

Comme tout médicament, rangez ce produit hors de la portée des enfants car il pourrait leur nuire.

DÉCLARATION DES EFFETS SECONDAIRES SOUPÇONNÉS

Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé au Programme Canada Vigilance de l'une des 3 façons suivantes :

- En ligne à www.santecanada.gc.ca/medeffet
- Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345
- En remplissant un formulaire de déclaration de Canada Vigilance et en le faisant parvenir
 - par télécopieur, au numéro sans frais 1-866-678-6789
 - par la poste au : Programme Canada Vigilance
Santé Canada
Index postal 0701D
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Les étiquettes préaffranchies, le formulaire de déclaration de Canada Vigilance ainsi que les lignes directrices concernant la déclaration d'effets indésirables sont disponibles sur le site Web de MedEffe^{MC} Canada à www.santecanada.gc.ca/medeffet.

REMARQUE : Pour obtenir des renseignements relatifs à la gestion des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

Vous pouvez vous procurer ce document ainsi que la monographie complète du produit, rédigée pour les professionnels de la santé, en communiquant avec Sanis Health Inc. au :

Tél: 1-866-236-4076 ;
Télécopieur: 905-689-1465
ou en écrivant au : quality@sanis.com

Ce feuillet de renseignements a été rédigé par :

Sanis Health Inc.
333 Champlain Street, Suite 102
Dieppe, New Brunswick
Canada, E1A 1P2

Date de révision : 8 juin 2010

71851IL-2400 Rev. 00

SANIS