

NOTICE : INFORMATION DU PATIENT

CLOMID 50 mg comprimés *Citrate de clomifène*

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Clomid et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Clomid ?
3. Comment prendre Clomid ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Clomid ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE CLOMID ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Clomid est une hormone sexuelle à base de citrate de clomifène. Le citrate de clomifène est une substance qui favorise l'ovulation et appartient au groupe des Modulateurs Sélectifs des Récepteurs aux Œstrogènes (substances qui ne modifient que l'effet des hormones sexuelles féminines).

On utilise Clomid pour provoquer l'ovulation chez les femmes souhaitant tomber enceintes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CLOMID ?

Ne prenez jamais Clomid

- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes enceinte.
- Si vous avez des troubles de la fonction du foie.
- Si vous avez des saignements anormaux.
- Si vous avez des kystes au niveau des ovaires (cavités remplies de liquide dans les ovaires).
- Si vous avez une lésion organique dans le crâne (p. ex. une tumeur de l'hypophyse).
- Si vous avez des troubles non contrôlés de la fonction de la thyroïde ou de la surrénale.
- Si vous avez des néoplasmes dépendant des œstrogènes (tumeurs bénignes ou malignes).

- Si vous avez des troubles visuels pendant le traitement ou si vous avez eu ces troubles pendant des traitements précédents.

Avertissements et précautions

- Dans certains cas, une stimulation trop forte des ovaires peut survenir (syndrome d'hyperstimulation ovarienne). Dans ce cas, l'administration de Clomid doit être arrêtée temporairement et votre dose ainsi que la durée du cycle de traitement suivant doivent être adaptés. Afin de détecter une hyperstimulation, il est important de consulter votre médecin traitant en cas de douleur dans le bassin ou dans le ventre, en cas d'inconfort ou de gonflement dans le ventre ainsi qu'en cas de prise de poids. Il/elle peut alors prendre les mesures adéquates.
- La prise de Clomid augmente le risque de grossesses multiples.
- La prudence est de rigueur :
 - en cas de certains types de cancer
 - en cas de thrombophlébite (inflammation d'une veine) et d'antécédents de thromboembolie (obstruction d'une veine)
 - hypertension sévère et non traitée (augmentation de la tension artérielle)
- Si vous allaitez : Clomid peut réduire la production de lait ; il est préférable de ne pas allaiter pendant que vous prenez Clomid.
- Si vous présentez des troubles visuels pendant le traitement (tels que des taches ou des flashes lumineux). **Dans ce cas, arrêtez le traitement et consultez votre médecin.**
- Si vous avez des excroissances bénignes dans l'utérus (fibromes utérins), leur volume peut augmenter pendant le traitement par Clomid.
- Si vous avez déjà souffert d'hyperlipidémie (augmentation des graisses dans le sang) ou si cette affection a déjà été observée dans votre famille et que vous prenez des quantités assez importantes de Clomid ou que vous êtes traité(e) pendant une durée supérieure à la normale, vous pouvez développer une hyperlipidémie.
- Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique « Autres médicaments et Clomid ».

Autres médicaments et Clomid

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

La prise simultanée de Clomid et de certaines autres hormones augmente le risque de stimulation excessive et de grossesses multiples.

Clomid ne peut être pris que sous surveillance gynécologique stricte.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse :

N'utilisez pas Clomid pendant votre grossesse.

Afin d'éviter que vous ne preniez Clomid au début de la grossesse, votre médecin doit exclure une grossesse avant de débiter ou répéter un traitement par Clomid.

Allaitement :

Il est préférable de ne pas utiliser Clomid pendant l'allaitement. Chez certaines patientes, une diminution de la production de lait a été observée.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Chez certaines patientes, des troubles visuels ont parfois été observés. Ces troubles peuvent constituer un danger au cours de la conduite d'un véhicule et de l'utilisation de machines, surtout en cas d'éclairage changeant.

Clomid contient du saccharose et du lactose

Si votre médecin vous a informée d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE CLOMID ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Clomid ne peut être utilisé **que sous surveillance gynécologique stricte et après avoir exclu une grossesse.**

La dose recommandée pour un premier traitement est d'un seul comprimé par jour pendant 5 jours, à partir du cinquième jour du cycle.

L'efficacité du traitement (l'obtention d'une ovulation) est évaluée au moyen de la courbe de température corporelle ou de tout autre moyen adéquat (taux plasmatiques de progestérone, échographie).

Si aucune ovulation ne survient, consultez votre médecin.

Il est important que les rapports sexuels coïncident avec la période probable de fertilité.

L'examen de la muqueuse de l'utérus peut s'avérer utile, surtout si l'on veut faire coïncider l'ovulation avec une insémination artificielle.

Votre médecin vous dira combien de temps vous devrez prendre Clomid.

Un traitement prolongé est déconseillé. Si le traitement est efficace, c'est généralement le cas pendant les 6 premiers cycles.

Si vous avez pris plus de Clomid que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé trop de Clomid, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245).

Les symptômes d'un surdosage sont : nausées, vomissements, bouffées de chaleur, troubles visuels ou flashes lumineux, visualisation de taches noires, augmentation du volume des ovaires s'accompagnant de douleurs abdominales (pouvant survenir dans les jours suivant l'arrêt du traitement par Clomid). Une prise de poids ou une rétention importante de liquide dans l'abdomen peuvent également s'observer.

Les patientes en âge de procréer ayant pris une dose très élevée doivent être surveillées pendant 2 à 3 semaines afin de détecter toute augmentation de volume des ovaires (contrôle au moyen de l'échographie et dosage de certaines hormones, p. ex. œstrogènes).

Si vous oubliez de prendre Clomid

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Si vous oubliez une dose, consultez votre médecin.

Si vous arrêtez de prendre Clomid

Il est important de poursuivre le traitement tant que votre médecin vous indique de le faire. N'arrêtez jamais brutalement le traitement sans d'abord consulter votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir :

Les effets indésirables généralement observés avec des doses plus élevées sont :

- augmentation du volume des ovaires, kystes, endométriose (formation de muqueuse utérine en dehors de l'utérus)
- bouffées de chaleur

Consultez votre médecin si vous constatez des douleurs au ventre ou au bassin, une prise de poids, une gêne ou un gonflement au niveau du ventre après la prise de Clomid.

D'autres effets indésirables sont :

- dans des cas exceptionnels : une rétention importante de liquide dans l'abdomen, qui disparaît généralement de manière spontanée.
- troubles de la vision incluant : vision trouble, visualisation d'une lueur ou de taches noires, de flashes lumineux ou d'images consécutives, diminution de l'acuité visuelle et rarement, cataracte (opacification totale ou partielle du cristallin ou de la capsule du cristallin) et névrite optique (inflammation du nerf de l'œil). **Arrêtez le traitement et consultez votre médecin.** Ces effets indésirables s'observent généralement après la prise d'une dose élevée et disparaissent habituellement quelques jours après l'arrêt du traitement.
- réactions de la peau : dermatite (inflammation de la peau), éruptions (éruptions cutanées), urticaire, rougeur, réactions allergiques, ecchymoses (bleus), perte de cheveux. Cette perte de cheveux est très rare et réversible à l'arrêt du traitement.
- étourdissements, nervosité (tension nerveuse) ou insomnie, fatigue ou dépression et convulsions. Ces effets sont néanmoins rares.
- mal de tête.
- quelques cas d'aggravation d'une psychose préalable (maladie mentale sévère).
- intolérance digestive, tension au niveau des seins, prise de poids, hyperlipidémie (augmentation des graisses dans le sang), parfois accompagnée de pancréatite (inflammation du pancréas) ; fait d'uriner fréquemment mais peu, règles abondantes et prolongées (hyperménorrhée), saignements survenant entre les règles et production insuffisante de la muqueuse de l'utérus.

Après la prise de Clomid, le risque de grossesses multiples augmente, y compris les grossesses intra- et extra-utérines (à l'intérieur et à l'extérieur de l'utérus).

Des cas isolés d'apparition ou d'aggravation de certaines tumeurs hormonodépendantes ont été observés.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans

cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/40, B-1060 Bruxelles.
Site internet: www.afmps.be / e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER CLOMID ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

N'utilisez pas ce médicament après la **date de péremption** indiquée sur l'emballage après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Clomid

La substance active est le citrate de clomifène.
Les autres composants sont : oxyde de fer jaune, lactose monohydraté, stéarate de magnésium, amidon de maïs, amidon de maïs prégélatinisé, saccharose.
(voir rubrique 2 : « Clomid contient du saccharose et du lactose »).

Aspect de Clomid et contenu de l'emballage extérieur

Clomid est disponible en boîtes de 10 comprimés emballés dans des plaquettes thermoformées (PVC/Alu).

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
☎ : 02/710.54.00
E-mail : info.belgium@sanofi.com

Fabricant

Patheon France
Boulevard de Champaret 40
FR – 38317 Bourgoin-Jallieu
France

Numéro d'autorisation de mise sur le marché : BE044511

Mode de délivrance : Médicament soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : 11/2013