

Notice : information du patient

Picato 150 microgrammes/gramme, gel mébutate d'ingénol

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Picato et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Picato
3. Comment utiliser Picato
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Picato
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Picato et dans quel cas est-il utilisé ?

Picato contient la substance active le mébutate d'ingénol.

Le médicament est un traitement topique (sur la peau) des kératoses actiniques, également appelé kératoses solaires, chez les adultes. Les kératoses actiniques sont des zones rugueuses de peau que l'on observe chez les personnes qui ont été exposés de façon excessive au soleil durant leur vie. Picato 150 microgrammes/gramme, gel est utilisé pour les kératoses actiniques sur le visage et le cuir chevelu.

2. Qu'est-ce que Picato et dans quel cas est-il utilisé ?

N'utilisez jamais Picato

- Si vous êtes allergique au mébutate d'ingénol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

- Eviter tout contact avec les yeux. En cas de contact accidentel, enlever le gel en rinçant abondamment avec de l'eau et demander un avis médical dès que possible.
- Ne pas avaler ce médicament. Si vous avalez accidentellement ce médicament, buvez beaucoup d'eau et demander un avis médical.
- S'assurer que votre peau a cicatrisé de tout traitement ou chirurgie antérieur avant l'utilisation de ce médicament. Ne pas appliquer Picato sur des plaies ouvertes ou sur la peau lésée.
- N'appliquer pas ce médicament sur les muqueuses, la zone près des yeux, à l'intérieur des narines, à l'intérieur de l'oreille ou sur les lèvres.
- Eviter l'exposition au soleil autant que possible (y compris les lampes à bronzer et les cabines de bronzage).
- Ce médicament est destiné à traiter une zone de 25 cm² pendant trois jours. Ceci doit être respecté scrupuleusement.
- N'appliquer pas plus de gel que votre médecin vous l'a conseillé.
- Vous devez vous attendre à avoir des réactions cutanées locales, comme des rougeurs et un gonflement, après l'application de ce médicament (voir rubrique 4). Contactez votre médecin si des réactions cutanées locales deviennent graves.

Enfants et adolescents

- Les kératoses actiniques ne touchent pas les enfants, et ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans.

Autres médicaments et Picato

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Si vous avez précédemment utilisé Picato ou un autre médicament similaire dites-le à votre médecin avant de commencer le traitement.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou envisagée d'avoir un enfant, demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament. Vous devez éviter l'utilisation de Picato si vous êtes enceinte.

Si vous allaitez, évitez le contact physique entre l'enfant et la zone traitée pendant les 6 heures qui suivent l'application de ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament n'a pas d'effet sur votre capacité à conduire ou utiliser des machines.


3. Comment utiliser Picato

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

- Le traitement des kératoses actiniques du visage et du cuir chevelu correspond à un tube de Picato 150 microgrammes/g gel (contenant 70 microgrammes de mébutate d'ingénol) à utiliser une fois par jour pendant 3 jours de suite.

Instruction d'utilisation :

- Ouvrir un nouveau tube chaque fois vous utilisez ce médicament. Enlevez le bouchon du tube juste avant de l'utiliser.
- Presser le gel hors du tube sur le bout du doigt.
- Appliquer le contenu d'un tube sur une zone de 25 cm² (par exemple 5 cm x 5 cm).
- Etaler doucement le gel sur la zone à traiter.
- Laisser sécher la zone pendant 15 minutes. Évitez de toucher la zone traitée pendant les 6 heures qui suivent l'application de votre médicament.
- Laver vos mains avec du savon et de l'eau immédiatement après l'application du gel.
- Ne pas appliquer ce médicament immédiatement après avoir pris une douche et moins de 2 heures avant d'aller vous coucher.
- Ne pas laver les zones sur lesquelles vous avez appliqué le gel pendant au moins 6 heures après l'application.
- Ne pas toucher la zone traitée ou ne laisser personne ni aucun animal de compagnie être en contact avec la zone traitée pendant les 6 heures qui suivent l'application du gel.
- Ne pas couvrir la zone traitée de bandages imperméables à l'air ou à l'eau après avoir appliqué ce médicament.
- L'effet maximal de Picato peut être évalué environ 8 semaines après le traitement.



Si vous avez utilisé plus de Picato que vous n'auriez dû

Veuillez contacter votre médecin ou pharmacien si vous avez utilisé plus de Picato que vous n'auriez dû.

Si vous oubliez d'utiliser Picato

Veuillez contacter votre médecin ou pharmacien si vous avez oublié d'utiliser Picato.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Après l'utilisation de ce médicament la peau où vous l'avez appliqué va probablement devenir rouge, peler et présenter des croûtes. Ces effets secondaires, arrivent le plus souvent le jour qui suit le début de l'application de ce médicament. Les effets secondaires peuvent s'aggraver jusqu'à 1 semaine après que vous ayez arrêté d'utiliser ce médicament. Ils s'améliorent en général dans les 2 semaines qui suivent le début du traitement.

Une infection de la peau au niveau de la zone de traitement peut survenir (a été rapportée comme un effet secondaire fréquent qui peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10, lors du traitement du visage et du cuir chevelu). Si les symptômes décrits ci-dessus s'intensifient au-delà de la première semaine après que vous ayez arrêté d'utiliser ce médicament, ou s'il y a un écoulement de pus, vous pourriez avoir une infection et devrez contacter votre médecin ou pharmacien.

Les effets indésirables les plus fréquents lors du traitement du visage et du cuir chevelu:

Effets indésirables très fréquents sur la zone de peau traitée, pouvant affecter plus de 1 personne sur 10 :

Sur la zone de traitement :

- Décollement d'une partie de la couche superficielle de votre peau (érosion)
- Ampoules (vésicules, pustules)
- Gonflement
- Desquamation (exfoliation)
- Croûtes
- Rougeur due à la dilatation des petits vaisseaux sanguins (érythème)
- Douleur

Les effets indésirables les plus fréquents lors du traitement du tronc et des extrémités :

Effets indésirables très fréquents sur la zone de peau traitée, pouvant affecter plus de 1 personne sur 10 :

Sur la zone de traitement :

- Décollement d'une partie de la couche superficielle de votre peau (érosion)
- Boutons (vésicules, pustules)
- Gonflement
- Ecaillage (exfoliation)
- Croûtes
- Rougeur due à la dilatation des petits vaisseaux sanguins (érythème)

Autres effets indésirables possibles lors du traitement du visage et du cuir chevelu :

Effets indésirables fréquents, pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 :

Sur la zone traitée :

- Démangeaison (prurit)
- Irritation

Autres effets indésirables :

- Gonflement de la zone autour de l'œil (œdème périorbital)
- Gonflement (œdème) de la paupière
- Mal de tête

Des effets indésirables rares, pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100 :

Sur la zone traitée :

- Picotement ou engourdissement (paresthésies)
- Plaies ouvertes (ulcère)
- Ecoulement (sécrétion) de fluide

Autres effets indésirables possibles :

- Douleur oculaire

Autres effets indésirables possibles lors du traitement du tronc et des extrémités :

Effets indésirables fréquents, pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 :

Sur la zone traitée :

- Démangeaison (prurit)
- Irritation
- Douleur

Des effets indésirables rares, pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100 :

Sur la zone traitée :

- Picotement ou engourdissement (paresthésies)
- Plaies ouvertes (ulcère)
- Chaleur

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. Comment conserver Picato

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage et le tube après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C).

A usage unique exclusivement. Ne pas réutiliser les tubes une fois ouverts.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Picato

- La substance active est le mébutate d'ingénol. Chaque gramme de gel contient 150 microgrammes de mébutate d'ingénol. Chaque tube contient 70 microgrammes de mébutate d'ingénol dans 0,47 g de gel.
- Les autres composants sont l'alcool isopropylique, l'hydroxyéthylcellulose, l'acide citrique monohydraté, le citrate de sodium, l'alcool benzylique, l'eau purifiée.

Qu'est ce que Picato et contenu de l'emballage extérieur

- Picato 150 microgrammes/gramme gel est transparent et incolore et chaque carton contient 3 tubes de 0,47 g de gel chacun.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK- 2750 Ballerup
Danemark

Fabricant

LEO Laboratories Ltd.
285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12
Irlande

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

België/Belgique/Belgien

LEO Pharma N.V./S.A
Tél/Tel: +32 3 740 7868

Luxembourg/Luxemburg

LEO Pharma N.V./S.A
Tél/Tel: +32 3 740 7868

България

Borola Ltd
Тел.: +359 2 9156 136

Magyarország

LEO Pharma
Tel: +36 1 888 0525

Česká republika

LEO Pharma s.r.o.
Tel: +420 225 992 272

Malta

PHARMA-COS LTD
Tel: +356 2144 1870

Danmark

LEO Pharma AB
Tlf: +45 70 22 49 11

Nederland

LEO Pharma B.V.
Tel: +31 205104141

Deutschland

LEO Pharma GmbH
Tel: +49 6102 2010

Norge

LEO Pharma AS
Tlf: +47 22514900

Eesti

LEO Pharma A/S
Tel: +45 44 94 58 88

Ελλάδα

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Τηλ: +30 210 68 34322

España

Laboratorios LEO Pharma, S.A.
Tel: +34 93 221 3366

France

LEO Pharma
Tél: +33 1 3014 4000

Ireland

LEO Pharma
Tel: +353 1 490 8924

Ísland

Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Italia

LEO Pharma S.p.A
Tel: +39 06 52625500

Κύπρος

The Star Medicines Importers Co. Ltd.
Τηλ: +357 2537 1056

Latvija

LEO Pharma A/S
Tel: +45 44 94 58 88

Lietuva

LEO Pharma A/S
Tel: +45 44 94 58 88

Österreich

LEO Pharma GmbH
Tel: +43 1 503 6979

Polska

LEO Pharma Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 244 18 40

Portugal

LEO Farmacêuticos Lda.
Tel: +351 21 711 0760

România

LEO Pharma Romania
Tel: +40 213121963

Slovenija

PHARMAGAN d.o.o.
Tel: +386 4 2366 700

Slovenská republika

LEO Pharma s.r.o.
Tel: +421 2 5939 6236

Suomi/Finland

LEO Pharma Oy
Puh/Tel: +358 20 721 8440

Sverige

LEO Pharma AB
Tel: +46 40 3522 00

United Kingdom

LEO Laboratories Ltd
Tel: +44 1844 347333

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est {MM/AAAA}.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Agence européenne des médicaments <http://www.ema.europa.eu>.

Notice : information du patient

Picato 500 microgrammes/gramme, gel mébutate d'ingénol

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Picato et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Picato
3. Comment utiliser Picato
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Picato
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Picato et dans quel cas est-il utilisé ?

Picato contient la substance active le mébutate d'ingénol.

Le médicament est un traitement topique (sur la peau) des kératoses actiniques, également appelé kératoses solaires, chez les adultes. Les kératoses actiniques sont des zones rugueuses de peau que l'on observe chez les personnes qui ont été exposés de façon excessive au soleil durant leur vie. Picato 500 microgrammes/gramme, gel est utilisé pour les kératoses actiniques sur le corps, les bras, les mains et les jambes.

2. Qu'est-ce que Picato et dans quel cas est-il utilisé ?

N'utilisez jamais Picato

- Si vous êtes allergique au mébutate d'ingénol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

- Eviter tout contact avec les yeux. En cas de contact accidentel, enlever le gel en rinçant abondamment avec de l'eau et demander un avis médical dès que possible.
- Ne pas avaler ce médicament. Si vous avalez accidentellement ce médicament, buvez beaucoup d'eau et demander un avis médical.
- S'assurer que votre peau a cicatrisé de tout traitement ou chirurgie antérieur avant l'utilisation de ce médicament. Ne pas appliquer Picato sur des plaies ouvertes ou sur la peau lésée.
- N'appliquer pas ce médicament sur les muqueuses, la zone près des yeux, à l'intérieur des narines, à l'intérieur de l'oreille ou sur les lèvres.
- Eviter l'exposition au soleil autant que possible (y compris les lampes à bronzer et les cabines de bronzage).
- Ce médicament est destiné à traiter une zone de 25 cm² pendant deux jours. Ceci doit être respecté scrupuleusement.
- N'appliquer pas plus de gel que votre médecin vous l'a conseillé.

- Vous devez vous attendre à avoir des réactions cutanées locales, comme des rougeurs et un gonflement, après l'application de ce médicament (voir rubrique 4). Contactez votre médecin si des réactions cutanées locales deviennent graves.

Enfants et adolescents

- Les kératoses actiniques ne touchent pas les enfants, et ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans.

Autres médicaments et Picato

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Si vous avez précédemment utilisé Picato ou un autre médicament similaire dites-le à votre médecin avant de commencer le traitement.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou envisagée d'avoir un enfant, demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament. Vous devez éviter l'utilisation de Picato si vous êtes enceinte.

Si vous allaitez, évitez le contact physique entre l'enfant et la zone traitée pendant les 6 heures qui suivent l'application de ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament n'a pas d'effet sur votre capacité à conduire ou utiliser des machines.


3. Comment utiliser Picato

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Le traitement des kératoses actiniques du corps, des bras, des mains et des jambes correspond à un tube de Picato 500 microgrammes/g gel (contenant 235 microgrammes de mébutate d'ingénol) à utiliser une fois par jour pendant 2 jours de suite

Instruction d'utilisation :

- Ouvrir un nouveau tube chaque fois vous utilisez ce médicament. Enlevez le bouchon du tube juste avant de l'utiliser.
- Presser le gel hors du tube sur le bout du doigt.
- Appliquer le contenu d'un tube sur une zone de 25 cm² (par exemple 5 cm x 5 cm).
- Etaler doucement le gel sur la zone à traiter.
- Laisser sécher la zone pendant 15 minutes. Évitez de toucher la zone traitée pendant les 6 heures qui suivent l'application de votre médicament.
- Laver vos mains avec du savon et de l'eau immédiatement après l'application du gel. Si vous traitez vos mains vous devrez seulement laver le bout du doigt que vous avez utilisé pour appliquer le gel.
- Ne pas appliquer ce médicament immédiatement après avoir pris une douche et moins de 2 heures avant d'aller vous coucher.
- Ne pas laver les zones sur lesquels vous avez appliqué le gel pendant au moins 6 heures après l'application.
- Ne pas toucher la zone traitée ou ne laisser personne ni aucun animal de compagnie être en contact avec la zone traitée pendant les 6 heures qui suivent l'application du gel.
- Ne pas couvrir la zone traitée de bandages imperméables à l'air ou à l'eau après avoir appliqué ce médicament.
- L'effet maximal de Picato peut être évalué environ 8 semaines après le traitement.



Si vous avez utilisé plus de Picato que vous n'auriez dû

Veillez contacter votre médecin ou pharmacien si vous avez utilisé plus de Picato que vous n'auriez dû.

Si vous oubliez d'utiliser Picato

Veillez contacter votre médecin ou pharmacien si vous avez oublié d'utiliser Picato.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Après l'utilisation de ce médicament la peau où vous l'avez appliqué va probablement devenir rouge, peler et présenter des croûtes. Ces effets secondaires, arrivent le plus souvent le jour qui suit le début de l'application de ce médicament. Les effets secondaires peuvent s'aggraver jusqu'à 1 semaine après que vous ayez arrêté d'utiliser ce médicament. Ils s'améliorent en général dans les 2 semaines qui suivent le début du traitement.

Une infection de la peau au niveau de la zone de traitement peut survenir (a été rapportée comme un effet secondaire fréquent qui peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10, lors du traitement du visage et du cuir chevelu). Si les symptômes décrits ci-dessus s'intensifient au-delà de la première semaine après que vous ayez arrêté d'utiliser ce médicament, ou s'il y a un écoulement de pus, vous pourriez avoir une infection et devrez contacter votre médecin ou pharmacien.

Les effets indésirables les plus fréquents lors du traitement du visage et du cuir chevelu:

Effets indésirables très fréquents sur la zone de peau traitée, pouvant affecter plus de 1 personne sur 10 :

Sur la zone de traitement :

- Décollement d'une partie de la couche superficielle de votre peau (érosion)
- Ampoules (vésicules, pustules)
- Gonflement
- Desquamation (exfoliation)
- Croûtes
- Rougeur due à la dilatation des petits vaisseaux sanguins (érythème)
- Douleur

Les effets indésirables les plus fréquents lors du traitement du tronc et des extrémités :

Effets indésirables très fréquents sur la zone de peau traitée, pouvant affecter plus de 1 personne sur 10 :

Sur la zone de traitement :

- Décollement d'une partie de la couche superficielle de votre peau (érosion)
- Boutons (vésicules, pustules)
- Gonflement
- Ecaillage (exfoliation)
- Croûtes
- Rougeur due à la dilatation des petits vaisseaux sanguins (érythème)

Autres effets indésirables possibles lors du traitement du visage et du cuir chevelu :

Effets indésirables fréquents, pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 :

Sur la zone traitée :

- Démangeaison (prurit)
- Irritation

Autres effets indésirables :

- Gonflement de la zone autour de l'œil (œdème périorbital)
- Gonflement (œdème) de la paupière
- Mal de tête

Des effets indésirables rares, pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100 :

Sur la zone traitée :

- Picotement ou engourdissement (paresthésies)
- Plaies ouvertes (ulcère)
- Écoulement (sécrétion) de fluide

Autres effets indésirables possibles :

- Douleur oculaire

Autres effets indésirables possibles lors du traitement du tronc et des extrémités :

Effets indésirables fréquents, pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 :

Sur la zone traitée :

- Démangeaison (prurit)
- Irritation
- Douleur

Des effets indésirables rares, pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100 :

Sur la zone traitée :

- Picotement ou engourdissement (paresthésies)
- Plaies ouvertes (ulcère)
- Chaleur

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. Comment conserver Picato

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage et le tube après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C).

A usage unique exclusivement. Ne pas réutiliser les tubes une fois ouverts.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Picato

- La substance active est le mébutate d'ingénol. Chaque gramme de gel contient 500 microgrammes de mébutate d'ingénol. Chaque tube contient 235 microgrammes de mébutate d'ingénol dans 0,47g de gel.
- Les autres composants sont l'alcool isopropylique, l'hydroxyéthylcellulose, l'acide citrique monohydraté, le citrate de sodium, l'alcool benzylique, l'eau purifiée.

Qu'est ce que Picato et contenu de l'emballage extérieur

- Picato 500 microgrammes/gramme gel est transparent et incolore et chaque carton contient 2 tubes de 0,47 g de gel chacun.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK- 2750 Ballerup
Danemark

Fabricant

LEO Laboratories Ltd.
285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12
Irlande

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

België/Belgique/Belgien

LEO Pharma N.V./S.A
Tél/Tel: +32 3 740 7868

Luxembourg/Luxemburg

LEO Pharma N.V./S.A
Tél/Tel: +32 3 740 7868

България

Borola Ltd
Тел.: +359 2 9156 136

Magyarország

LEO Pharma
Tel: +36 1 888 0525

Česká republika

LEO Pharma s.r.o.
Tel: +420 225 992 272

Malta

PHARMA-COS LTD
Tel: +356 2144 1870

Danmark

LEO Pharma AB
Tlf: +45 70 22 49 11

Nederland

LEO Pharma B.V.
Tel: +31 205104141

Deutschland

LEO Pharma GmbH
Tel: +49 6102 2010

Norge

LEO Pharma AS
Tlf: +47 22514900

Eesti

LEO Pharma A/S

Österreich

LEO Pharma GmbH

Tel: +45 44 94 58 88

Ελλάδα

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Τηλ: +30 210 68 34322

España

Laboratorios LEO Pharma, S.A.
Tel: +34 93 221 3366

France

LEO Pharma
Tél: +33 1 3014 4000

Ireland

LEO Pharma
Tel: +353 1 490 8924

Ísland

Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Italia

LEO Pharma S.p.A
Tel: +39 06 52625500

Κύπρος

The Star Medicines Importers Co. Ltd.
Τηλ: +357 2537 1056

Latvija

LEO Pharma A/S
Tel: +45 44 94 58 88

Lietuva

LEO Pharma A/S
Tel: +45 44 94 58 88

Tel: +43 1 503 6979

Polska

LEO Pharma Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 244 18 40

Portugal

LEO Farmacêuticos Lda.
Tel: +351 21 711 0760

România

LEO Pharma Romania
Tel: +40 213121963

Slovenija

PHARMAGAN d.o.o.
Tel: +386 4 2366 700

Slovenská republika

LEO Pharma s.r.o.
Tel: +421 2 5939 6236

Suomi/Finland

LEO Pharma Oy
Puh/Tel: +358 20 721 8440

Sverige

LEO Pharma AB
Tel: +46 40 3522 00

United Kingdom

LEO Laboratories Ltd
Tel: +44 1844 347333

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est {MM/AAA}.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Agence européenne des médicaments <http://www.ema.europa.eu>.
