

# Desloratadine

Zentiva®

**0,5 mg/ml**

Solution buvable

Voie orale

Adulte et enfant de plus de 1 an

**Votre pharmacien vous a délivré un médicament générique.**

Ce médicament correspond au traitement que votre médecin vous a prescrit sous un autre nom de marque. Comme tout médicament, son efficacité et sa qualité ont été rigoureusement contrôlées.

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Dans cette notice :**

1. Qu'est-ce que DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable ?
3. Comment prendre DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable ?
6. Informations supplémentaires

**1. QU'EST-CE QUE Desloratadine Zentiva, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

La desloratadine est un médicament contre l'allergie qui ne vous rend pas somnolent. Il aide à contrôler votre réaction allergique et ses symptômes.

La desloratadine soulage les symptômes associés à la rhinite allergique (inflammation nasale provoquée par une allergie, par exemple, le rhume des foins ou l'allergie aux acariens). Ces symptômes comprennent les éternuements, le nez qui coule ou qui démange, les démangeaisons du palais, les yeux qui démangent, qui sont rouges ou larmoyants.

La desloratadine est également utilisée pour soulager les symptômes associés à l'urticaire (atteinte cutanée provoquée par une allergie). Ces symptômes comprennent les démangeaisons et éruptions urticariennes.

Le soulagement de ces symptômes dure toute la journée et vous aide à poursuivre vos activités quotidiennes normales et préserve votre sommeil.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Desloratadine Zentiva, solution buvable ?**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable dans le cas suivant :**

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la desloratadine, à la loratadine, ou à l'un des autres composants contenus dans DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable.

DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable est indiqué chez l'enfant de 1 à 11 ans, l'adolescent (12 ans et plus) et l'adulte, dont les personnes âgées.

**Faites attention avec DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable**

- si vous présentez une maladie des reins.

Si vous êtes concerné ou si vous avez un doute, consultez votre médecin avant de prendre DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

**Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Il n'y a pas d'interaction connue de DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable avec d'autres médicaments.

**Aliments et boissons**

DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable peut être pris pendant ou en dehors des repas.

**Grossesse - Allaitement**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament durant votre grossesse et si vous allaitez.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, l'utilisation de desloratadine n'est pas recommandée.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines**

A la dose recommandée, la desloratadine ne rend généralement pas somnolent et ne diminue pas la vigilance.

Cependant, très rarement ont été rapportés des cas de somnolence susceptible d'affecter l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines.

**Informations importantes concernant certains composants de DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable**

Ce médicament contient du sorbitol.

## **3. COMMENT PRENDRE Desloratadine Zentiva, solution buvable ?**

**Posologie**

Enfants de 1 à 5 ans : prendre 2,5 ml (½ cuillère de 5 ml) de solution buvable une fois par jour.

Enfants de 6 à 11 ans : prendre 5 ml (une cuillère de 5 ml) de solution buvable une fois par jour.

Adultes et adolescents (12 ans et plus) : prendre 10 ml (deux cuillères de 5 ml) de solution buvable une fois par jour.

### **Mode d'administration**

Utilisez la seringue graduée pour prendre la quantité appropriée de solution buvable. Avalez la dose de solution buvable et puis buvez un peu d'eau. Vous pouvez prendre ce médicament au moment ou en dehors des repas.

### **Durée de traitement**

Concernant la durée du traitement, votre médecin déterminera le type de rhinite allergique dont vous souffrez et déterminera la durée pendant laquelle vous devrez prendre DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable.

Si votre rhinite allergique est intermittente (présence de symptômes sur une période de moins de 4 jours par semaine ou sur une période inférieure à 4 semaines), votre médecin vous recommandera ce traitement pour une durée qui dépendra de l'évaluation des antécédents de votre maladie.

Si votre rhinite allergique est persistante (présence de symptômes sur une période de 4 jours ou plus par semaine et pendant plus de 4 semaines), votre médecin peut vous recommander ce traitement pour une durée plus longue.

Concernant l'urticaire, la durée de traitement peut être variable d'un patient à l'autre et vous devez donc suivre les instructions de votre médecin.

### **Si vous avez pris plus de DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable que vous n'auriez dû :**

Prenez DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable uniquement comme il vous a été prescrit. Aucun problème sérieux n'est attendu lors d'un surdosage accidentel. Cependant, si vous avez pris plus de DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable que vous n'auriez dû, prévenez votre médecin ou votre pharmacien.

### **Si vous oubliez de prendre DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable :**

Si vous oubliez de prendre votre dose à temps, prenez-la dès que possible, puis continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Chez la plupart des enfants et adultes, les effets indésirables avec DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable sont à peu près les mêmes que ceux observés avec une solution ou un comprimé placebo. Cependant, les effets indésirables fréquents chez les enfants âgés de moins de 2 ans étaient diarrhée, fièvre et insomnie alors que chez l'adulte, la fatigue, la sécheresse de la bouche et le mal de tête ont été rapportés plus souvent qu'avec un comprimé placebo.

Depuis la commercialisation de la desloratadine en solution buvable, des cas de réactions allergiques sévères (avec gêne respiratoire, sifflements bronchiques, démangeaisons, plaques d'urticaire et gonflements) et d'éruption cutanée ont été très rarement rapportés.

Des cas de palpitations, d'accélération du rythme cardiaque, de douleur d'estomac, de nausées (envie de vomir), de vomissements, de pesanteur d'estomac, de diarrhées, vertige, somnolence, insomnie, douleur musculaire, d'hallucinations, de convulsions, d'agitation avec mouvements corporels augmentés, inflammation du foie et d'anomalies du bilan hépatique sanguin ont aussi été très rarement rapportés.

### **Déclarations des effets indésirables**

Si vous ressentez un effet indésirable qu'il soit ou non mentionné dans cette notice, prévenez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou un autre professionnel de santé (infirmière...). Vous pouvez également signaler cet effet indésirable directement au Centre Régional de Pharmacovigilance dont vous dépendez à l'aide du formulaire de signalement disponible sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des Produits de Santé (ANSM) [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr).

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à améliorer la connaissance sur la sécurité du médicament.

### **5. COMMENT CONSERVER Desloratadine Zentiva, solution buvable ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable après la date de péremption mentionnée sur la boîte après EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### **6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

#### **Que contient DESLORATADINE ZENTIVA 0,5 mg/ml, solution buvable ?**

##### **La substance active est :**

Desloratadine .....0,5 mg  
pour 1 ml de solution buvable

##### **Les autres composants sont :**

Sorbitol liquide, propylène glycol, acide citrique monohydraté, citrate de sodium, hypromellose, sucralose, édétate disodique, arôme tutti frutti, eau purifiée.

#### **Qu'est-ce que DESLORATADINE ZENTIVA, solution buvable 0,5 mg/ml, solution buvable et contenu de l'emballage extérieur ?**

Solution buvable, incolore et limpide.

50 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml ou 150 ml sous flacon de verre brun muni d'un bouchon sécurité enfant (propylène/LDPE) et d'une cuillère-doseuse ou d'une seringue pour administration orale.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

### **Titulaire et exploitant**

sanofi-aventis France  
1-13, boulevard Romain Rolland  
75014 Paris – France

Si vous avez des questions sur ce produit ou si vous souhaitez nous signaler un effet indésirable, consultez

la rubrique Nos médicaments sur le site [sanofi.fr](http://sanofi.fr) ou contactez-nous par téléphone

Information Patient : N° vert 0800 222 555

Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23.

### **Fabricants**

Spécifar SA  
12351 Athènes - Grèce

ou

Famar Orléans  
45071 Orléans Cédex 2 - France

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Septembre 2013/V1.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

ZENTIVA

SANOFI 