

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

### ACICLOVIR TEVA 5% CREME

aciclovir

**Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.**

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u ACICLOVIR TEVA 5% CREME zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

**In deze bijsluiter:**

1. Wat is ACICLOVIR TEVA 5% CREME en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u ACICLOVIR TEVA 5% CREME gebruikt
3. Hoe wordt ACICLOVIR TEVA 5% CREME gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u ACICLOVIR TEVA 5% CREME
6. Aanvullende informatie

#### **1. WAT IS ACICLOVIR TEVA 5% CREME EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT**

ACICLOVIR TEVA 5% Crème bevat aciclovir, een middel tegen herpesvirussen.

Het is aangewezen voor de behandeling van koortsblaasjes.

#### **2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ACICLOVIR TEVA 5% CREME GEBRUIKT**

**Gebruik ACICLOVIR TEVA 5% CREME niet**

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor aciclovir, valaciclovir of voor één van de andere bestanddelen van de crème basis.

**Wees extra voorzichtig met ACICLOVIR TEVA 5% CREME**

- een eerste herpesaanval zal bij voorkeur door een geneesheer vastgesteld worden.
- ACICLOVIR TEVA 5% Crème is niet aangewezen voor toepassing op de slijmvliezen van de mond.
- men zal er voor zorgen dat de crème niet in de ogen terechtkomt.
- prikkelingsverschijnselen zijn mogelijk maar zijn van voorbijgaande aard.
- gebruik ACICLOVIR TEVA 5% Crème niet voor de behandeling van genitale herpes.
- het advies van een geneesheer of apotheker is noodzakelijk indien de huidletsels op een ongebruikelijke wijze evolueren tijdens het gebruik van de crème. Het kan, bijvoorbeeld, wijzen op een bacteriële superinfectie.
- indien u lijdt aan een ernstige immunodepressie (bvb. indien u lijdt aan AIDS of indien u een beenmergtransplantatie hebt ondergaan). Raadpleeg uw arts voor de behandeling van elke infectie.

**Gebruik met andere geneesmiddelen**

Men heeft geen enkele klinisch significante interactie gevonden.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

### **Gebruik van ACICLOVIR TEVA 5% CREME met voedsel en drank**

Geen bijzonderheden.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

#### *Zwangerschap*

Gebruik van ACICLOVIR TEVA 5% CREME op de koorstblaasjes is niet tegenaangewezen bij zwangerschap. Natuurlijk is voorzichtigheid geboden. Raadpleeg uw arts of apotheker bij twijfel.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt/gebruikt.

#### *Borstvoeding*

Gebruik van ACICLOVIR TEVA 5% CREME op de koorstblaasjes is niet tegenaangewezen bij borstvoeding. Natuurlijk is voorzichtigheid geboden. Raadpleeg uw arts of apotheker bij twijfel.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt/gebruikt.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

ACICLOVIR TEVA 5% CREME heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

### **Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van ACICLOVIR TEVA 5% CREME**

Niet van toepassing.

## **3. HOE WORDT ACICLOVIR TEVA 5% CREME GEBRUIKT**

Volg bij het gebruik van ACICLOVIR TEVA 5% CREME nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Indien u geen verbetering ziet, raadpleeg nogmaals uw arts.

#### Volwassenen en kinderen:

- ACICLOVIR TEVA 5% Crème moet vijfmaal daags met tussenpozen van ongeveer vier uur gedurende 5 dagen worden aangebracht op de aangedane huidgedeelten.
- De behandeling moet 5 dagen voortgezet worden, ook al breken de letsels niet helemaal door.
- Bij onvolledige genezing, mag de behandeling nog 5 bijkomende dagen verdergezet worden.
- ACICLOVIR TEVA 5% Crème moet zo spoedig mogelijk na het begin van de infectie worden aangebracht op de lesies of de zich nog vormende lesies.
- Een recidiverende infectie wordt vaak voorafgegaan door een korte periode waarbij de betrokken zones pijnlijk en gevoelloos zijn; ze zijn gloeiend of jeukend. Elke persoon die reeds koorstblaasjes gehad heeft, herkent deze tekenen en kan bijgevolg een opstoot voelen aankomen. De behandeling dient bij voorkeur te beginnen in dit stadium of onmiddellijk na het verschijnen van de eerste blaasjes.

De crème is bestemd voor uitwendig gebruik.

### **Wat u moet doen als u meer van ACICLOVIR TEVA 5% CREME heeft gebruikt dan u zou mogen**

Dosissen tot 4 g aciclovir werden oraal toegediend gedurende 10 dagen zonder schadelijke bijwerkingen. Bij accidenteel inslikken van de volledige tube van 2 g crème met 100 mg aciclovir zijn geen schadelijke effecten te verwachten. Aciclovir kan door middel van dialyse uit het lichaam worden verwijderd.

Indien u teveel ACICLOVIR TEVA 5% CREME heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

### **Wat u moet doen wanneer u bent vergeten ACICLOVIR TEVA 5% CREME te gebruiken**

Zodra u merkt dat u vergeten bent ACICLOVIR TEVA 5% CREME te gebruiken, breng ACICLOVIR TEVA 5% CREME aan en vervolg de behandeling zoals uitgelegd in rubriek "Hoe wordt ACICLOVIR TEVA 5% CREME gebruikt".

### **Als u stopt met het gebruik van ACICLOVIR TEVA 5% CREME**

Geen bijzonderheden.

## **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals alle geneesmiddelen kan ACICLOVIR TEVA 5% CREME bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen werden gemeld:

#### Aandoeningen van de huid en onderhuid.

Zelden  $\geq 1/1.000$  en  $\leq 1/100$

- Voorbijgaand branderig of stekend gevoel na het aanbrengen van de crème
- licht uitdrogen of afschilferen van de huid.

Zeer zelden  $\geq 1/10.000$  en  $\leq 1/1.000$

- roodheid (erytheem)
- allergische reactie van de huid (contactdermatitis). In dit geval dient de behandeling gestopt te worden.

#### Aandoeningen van het immuunsysteem:

Uiterst zelden  $\geq 1/100.000$  en  $\leq 1/10.000$

- directe overgevoeligheidsreacties. In dit geval dient de behandeling gestopt te worden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

## **5. HOE BEWAART U ACICLOVIR TEVA 5% CREME**

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15 – 25 °C).

Gebruik ACICLOVIR TEVA 5% CREME niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na "EXP". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

## **6. AANVULLENDE INFORMATIE**

### **Wat bevat ACICLOVIR TEVA 5% CREME**

- Het werkzaam bestanddeel is aciclovir.

- De andere bestanddelen zijn Propyleenglycol - Tefose - Labrafil - Minerale olie - Poloxamer 407 - Natriumlaurylsulfaat - Gezuiverd water

**Hoe ziet ACICLOVIR TEVA 5% CREME er uit en wat is de inhoud van de verpakking**

Tube met 2 g crème.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen**

Teva Pharma Belgium N.V.  
Laarstraat 16  
B-2610 Wilrijk

**Fabrikant**

Laboratorio Farmaceutico C.T.  
Via D. Alighieri 71  
18038 Sanremo (IM)  
Italië

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**

BE 216361

**Afleveringswijze**

Vrije aflevering

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in maart 2009**