

Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Domperidon PCH al eerder heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is.

Domperidon 10 PCH voor zuigelingen, zetpillen 10 mg
Domperidon 30 PCH voor kinderen, zetpillen 30 mg
Domperidon 60 PCH voor volwassenen, zetpillen 60 mg

WAT ZIJN DOMPERIDON PCH ZETPILLEN?

Domperidon PCH zetpillen zijn wit tot lichtgeel van kleur en torpedovormig. Er zijn Domperidon PCH zetpillen voor zuigelingen, voor kinderen en voor volwassenen. Domperidon PCH zetpillen voor zuigelingen bevatten 10 mg domperidon per zetpil. Domperidon PCH zetpillen voor kinderen bevatten 30 mg domperidon per zetpil. Domperidon PCH zetpillen voor volwassenen bevatten 60 mg domperidon per zetpil. Domperidon is de stof die zorgt voor de werking van Domperidon PCH zetpillen. Domperidon zorgt ervoor dat voedsel sneller door de maag en de darmen gaat.

De zetpillen bevatten verder: polyethyleenglycol 4000, polyethyleenglycol 400, polyethyleenglycol 1000, wijnsteenzuur (E334) en gebutyleerd hydroxyanisool (E320).

Domperidon PCH zetpillen 10, 30 en 60 mg zijn verpakt in een doosje met 6 zetpillen in een strip. Domperidon PCH zetpillen zijn in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder respectievelijk RVG 19534-07681 (Domperidon 10 PCH voor zuigelingen) RVG 19536-07682 (Domperidon 30 PCH voor kinderen) RVG 19538-07683 (Domperidon 60 PCH voor volwassenen), op naam van Pharmachemie B.V. Swensweg 5 Postbus 552 2003 RN Haarlem

WANNEER GEBRUIKT U DOMPERIDON PCH ZETPILLEN?

Domperidon PCH wordt gebruikt voor de verlichting van misselijkheid en braken (bij kinderen of volwassenen). Bij volwassenen wordt Domperidon PCH ook gebruikt voor de verlichting van een opgeblazen of vol gevoel in de maag na het eten en voor terugvloeien van de maaginhoud (oprispingen).

WANNEER MAG U DOMPERIDON PCH ZETPILLEN NIET GEBRUIKEN?

- U mag Domperidon PCH niet gebruiken wanneer u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen in de zetpillen. Welke dit zijn, vindt u onder 'Wat zijn Domperidon PCH zetpillen?'. U kunt overgevoeligheid herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk of een opgezwollen gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Domperidon PCH en raadpleeg uw arts.
- Domperidon PCH mag niet worden gebruikt bij een bepaalde hersentumor (een zogenaamd prolactinoom).

- U mag Domperidon PCH niet gebruiken wanneer u ernstige buikkramen of aanhoudend zwarte ontlasting heeft. In deze gevallen moet u altijd eerst met uw arts overleggen of u Domperidon PCH wel mag gebruiken.

WELKE SPECIALE VOORZORGEN MOET U NEMEN?

- **Zwangerschap**
Het is niet bekend of Domperidon PCH bij zwangerschap schadelijk is. Bent u in verwachting of gedurende de behandeling van plan in verwachting te raken? Overleg dan eerst met uw arts of u Domperidon PCH kunt gebruiken.
- **Borstvoeding**
Kleine hoeveelheden van stoffen uit Domperidon PCH zouden in de moedermelk terecht kunnen komen. Daarom is het beter Domperidon PCH niet te gebruiken als u borstvoeding geeft. Overleg hierover met uw arts.
- **Kleine kinderen**
Als Domperidon PCH wordt gegeven aan kleine kinderen, is er een klein risico dat ze last krijgen van bewegingsstoornissen, zoals stijve spieren, trillen en onwillekeurige bewegingen. Het is belangrijk dat u zich strikt houdt aan de dosering die uw arts heeft voorgeschreven of aan de dosering zoals vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- **Bij slechte werking van uw lever**
U mag Domperidon PCH niet gebruiken als u een leverziekte heeft. U dient eerst een arts te raadplegen.
- **Bij slechte werking van uw nieren**
Neem eerst contact op met uw arts als u een nierziekte heeft en u Domperidon PCH gedurende een lange periode gaat gebruiken.
- **Bij gebruik van een middel tegen schimmelinfecties**
Als u een geneesmiddel gebruikt tegen schimmelinfecties dat ketoconazol bevat, neem dan contact op met uw arts. Het kan zijn dat hij u een ander middel tegen de schimmelinfectie voorschrijft. Zie hiervoor ook de rubriek 'Andere geneesmiddelen en Domperidon PCH'.
- **Waarschuwingen**
Wanneer u Domperidon PCH niet op voorschrift van een arts gebruikt, mag u het nooit langer dan 14 dagen gebruiken. Neem contact op met uw arts wanneer uw klachten na 14 dagen nog niet zijn verdwenen.
- **Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke**
U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer en dergelijke. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat Domperidon PCH invloed heeft op het reactievermogen.
- **Extra informatie over bepaalde bestanddelen**
Domperidon PCH zetpillen bevatten gebutyleerd hydroxyanisool. Gebutyleerd hydroxyanisool kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis), of irritatie aan de ogen en slijmvliezen.

Andere geneesmiddelen en Domperidon PCH

Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken (ook geneesmiddelen die u zonder recept koopt). Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (van bijvoorbeeld de dosering).

Als u naast Domperidon PCH zetpillen geneesmiddelen gebruikt die de bewegingen van de maag en de darmen vertragen, kan dit de werkzaamheid van Domperidon PCH beïnvloeden. Ook kunnen de volgende middelen de werkzaamheid van Domperidon PCH beïnvloeden:

- geneesmiddelen tegen schimmelinfecties die bijvoorbeeld ketoconazol, itraconazol, miconazol of fluconazol bevatten;
- geneesmiddelen tegen bacteriële infecties (antibiotica) die bijvoorbeeld erytromycine, claritromycine of troleandomycine bevatten;
- bepaalde geneesmiddelen tegen HIV-infecties zoals ritonavir en indinavir;
- geneesmiddelen tegen depressieve aandoeningen die nefazodon bevatten.

Informeer uw arts of apotheker in elk geval wanneer u naast Domperidon PCH een van deze middelen gebruikt, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

DOSERING VAN DOMPERIDON PCH ZETPILLEN

Als u Domperidon PCH op recept gebruikt, vertelt uw arts of apotheker u hoeveel Domperidon PCH u moet gebruiken. Houdt u altijd nauwkeurig aan dit voorschrift. In het algemeen zijn de regels als volgt:

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar (35 kg of meer)

2 maal per dag 1 zetpil voor volwassenen (60 mg domperidon). De duur van de eerste behandeling is 4 weken bij een opgeblazen of vol gevoel in de maag na het eten en bij oprispingen.

Kinderen


Bij kinderen is de dosering afhankelijk van het lichaamsgewicht. De zetpillen mogen niet gebruikt worden bij kinderen die minder wegen dan 5 kg. Voor een kind van 5 tot 15 kg: 2 maal per dag 1 zetpil voor zuigelingen (met 10 mg domperidon). Voor een kind van meer dan 15 kg: 2 maal per dag 1 zetpil voor kinderen (met 30 mg domperidon).

Als u Domperidon PCH niet op voorschrift van een arts gebruikt, mag u het nooit langer dan 14 dagen gebruiken.


Hoe moet u Domperidon PCH zetpillen gebruiken?

- U kunt Domperidon PCH zetpillen op elk tijdstip van de dag inbrengen.
- Zetpillen zijn bedoeld om in de anus, van achteren dus, te worden ingebracht.
- Het is het beste om zetpillen in te brengen in een lege endeldarm (dus nadat u ontlasting heeft gehad). Ga daarom, indien nodig, eerst naar het toilet.

- Scheur 1 verpakte zetpil van de totale strip.



- Trek daarna de 2 laagjes waaruit de strip bestaat van elkaar. Dit gaat het gemakkelijkst aan de puntzijde van de strip.



- Neem de zetpil uit de strip. U kunt de zetpil het beste even bevochtigen met wat water. Dan gaat het inbrengen gemakkelijker.
- Het inbrengen gaat ook gemakkelijker als u op uw zij ligt, met uw knieën opgetrokken.
- Breng de zetpil met de punt naar voren in de anus. Blijf dan enkele minuten liggen. Soms kan het nodig zijn om de zetpil tegen te houden, bijvoorbeeld met een propje watten. Wanneer u dat prettiger vindt, kunt u de zetpil ook met de stompe kant naar voren inbrengen.
- Probeer te voorkomen dat u binnen een uur na het inbrengen van de zetpil ontlasting heeft.

Stoppen met Domperidon PCH

Als u Domperidon PCH op recept gebruikt, stop dan niet op eigen houtje met de behandeling, maar houd u aan het voorschrift van uw arts.

Wat moet u doen bij overdosering?

Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving meer Domperidon PCH heeft gebruikt dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing (zie onder 'Dosering van Domperidon PCH zetpillen'). Raadpleeg in deze gevallen altijd een arts. De verschijnselen die bij overdosering kunnen optreden, zijn: sufheid, verwardheid en bepaalde bewegingsstoornissen zoals stijve spieren, beverigheid, onwillekeurige bewegingen en niet lang stil kunnen zitten. Kinderen zijn gevoeliger voor grote hoeveelheden Domperidon PCH dan volwassenen. Neem daarom onmiddellijk contact op met een arts als een kind Domperidon PCH heeft gebruikt; ook als de zetpil is ingeslikt.

Wat moet u doen als u bent vergeten uw Domperidon PCH zetpil in te brengen?

Wanneer u bent vergeten uw Domperidon PCH zetpil in te brengen, doe dat dan alsnog zodra u dat merkt. Maar wanneer het al bijna tijd is voor de volgende zetpil, is het verstandiger de vergeten zetpil niet meer in te brengen.


DOMPERIDON



PHARMACHEMIE

Swensweg 5, Haarlem
Postbus 552
2003 RN Haarlem

DOMPERIDON



PHARMACHEMIE

Swensweg 5, Haarlem
Postbus 552
2003 RN Haarlem

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen.

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (bij 1 op de 1000 tot 10.000 patiënten)

Geslachtsorganen/horsten

Uitblijven van de menstruatie, melkafscheiding uit de tepels bij vrouwen en lichte borstontwikkeling bij mannen.

Maag en darmen

Maag-darmstoornissen, in uitzonderlijke gevallen met darmkrampen.

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

Afweersysteem

Allergische reacties zoals huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem). Bij ernstige overgevoeligheid voor stoffen in het geneesmiddel kan een ernstige reactie optreden waarbij de bloedvaten plotseling zeer wijf worden, met als gevolg dat de bloeddruk daalt en het hart snel maar zwak klopt, zichtbaar als bleekheid, onrust, en klamme huid (anafylactische reactie). In extreme gevallen kan bewustzijnsverlies optreden (anafylactische shock);

Zenuwstelsel

Bewegingsstoornissen zoals stijve spieren, beverigheid, onwillekeurige bewegingen en niet lang stil kunnen zitten.

Maag en darmen

Diarree.

Huid

Jeuk en huiduitslag.

Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

HOE BEWAART U DOMPERIDON PCH ZETPILLEN?

De juiste bewaarwijze is:

- in de originele verpakking
- samen met deze gebruiksaanwijzing
- niet boven 25°C
- buiten het bereik en zicht van kinderen.

HOE LANG ZIJN DOMPERIDON PCH ZETPILLEN HOUDBAAR?

Domperidon PCH zetpillen zijn houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na 06-2008 of EXP.: 06-2008 betekent dat u het geneesmiddel na juni 2008 niet meer mag gebruiken.

Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in februari 2006.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...

Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.

Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.

Wat houdt een juist gebruik in?

- Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
- Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid.
- Gebruik het niet langer dan is aangegeven.

Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.

Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.

Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer, die is meestal te vochtig.

Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.

Wilt u meer weten over Domperidon PCH of over misselijkheid en braken? Vragen over Domperidon PCH of over misselijkheid en braken kunt u het beste stellen aan uw arts of apotheker. Voor vragen over misselijkheid en braken kunt u ook contact opnemen met de Maag Lever Darm Stichting MLDS: 0900-20 25 625.

0206.4v.HW