

ULOTKA DLA PACJENTA

KAPSUŁKI 250mg erytromycyny

Prosimy o zapoznanie się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

- Należy zachować tę ulotkę. Może trzeba będzie ją ponownie przeczytać.
- Jeśli masz dodatkowe pytania, proszę zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Może ona

im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

• Jeśli którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

• Lekarz może dać ci tego leku z innej firmy

i może to wyglądało nieco inaczej. Każda marka będzie miała taki sam skutek.

W ulotce

1. Jaki lek jest i co się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek
3. Jak zażywać lek
4. Możliwe skutki uboczne
5. Jak przechowywać lek
6. Dalsze informacje

1. CO leku IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Erytromycyna, należy do grupy leków zwanych antybiotyki, które działają przez zapobieganie

wzrost i namnażanie bakterii.

Erytromycyna jest przepisywany w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie, w tym:

- Górne i dolne infekcje dróg oddechowych
- skóry i innych zakażeń tkanek miękkich, w tym trądzik
- ucha, infekcje jamy ustnej i oczu
- zakażeń przewodu pokarmowego (np. pęcherzyka żółciowego lub zakażenia jelitowe)
- innych infekcji, takich jak kiła czy rzeżączka

Erytromycyna jest przewidziany do zapobiegania infekcjom, gdy pacjenci:

- będą mieć lub miał ostatnio dentystycznych lub chirurgicznych procedur
- ucierpiały z powodu oparzeń
- miał gorączki reumatycznej
- uczulenie na penicylinę i mają choroby serca

2. ZANIM przyjmować lekarstwa

NIE BIERZ erytromycyna i poinformować lekarza, jeśli:

• uczulenie (nadwrażliwość) na erytromycynę, do jakiegokolwiek innego leku zawierającego erytromycynę lub

do każdego ze składników w kapsułce

• przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

- dihydroergotamina, ergotamina (migreny)
- cyzapryd (zaburzeń żołądkowych)
- astemizol, mizolastyna i terfenadyna (leki przeciwhistaminowe, w leczeniu alergii)
- pimozyd i sertindol (w leczeniu zaburzeń psychicznych)

- symwastatyny (na zmniejszenie stężenia cholesterolu we krwi)
- tolterodyna (nietrzymania moczu)
- amisulpride (schizofrenii)

Zachować szczególną ostrożność stosując lek, jeśli:

- cierpi z powodu chorób wątroby
- cierpią z powodu miastonii, stan charakteryzuje osłabienie mięśni, trudności żucia i połykania i zaburzenia mowy

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, w tym leki wydawane bez recepty.

Erytromycyna są znane interakcje z następującymi lekami:

- eletryptanu (migreny)
- klozapina, kwetiapina (w leczeniu zaburzeń psychicznych)
- acenokumarol i warfaryna (w celu zapobiegania tworzeniu się zakrzepów krwi)
- alfentanyl, midazolam i triazolam (środki uspokajające, które mogą być podawane przed operacją)
- atorwastatyna, lowastatyna (dla zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi)
- bromokryptyna i kabergolina (w chorobie Parkinsona)
- buspiron (do niepokoju)
- karbamazepina, hexobarbital, fenytoina i kwas walproinowy (lek przeciwpadaczkowy)
- chloramfenikol, klindamycyna i linkomycyna (w zakażeniach)
- cyklosporyna i takrolimus (w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu po transplantacji lub organy)
- cilostazol (w przypadku problemów krążenia)
- cymetydyna (w leczeniu choroby wrzodowej żołądka)
- digoksyna, dizopiramid i chinidyna (dla chorób serca)
- felodypiny (wysokiego ciśnienia krwi),
- ryfabutyliny (gruźlicy)
- sildenafil i tadalafil (zaburzeń erekcji u mężczyzn)
- teofilina (w przypadku problemów z oddychaniem)
- zopiklon (na bezsenność).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli jesteś w ciąży, planuje ciążę lub karmi piersią, należy poprosić lekarza o Przed zażyciem leku. Erytromycyna może zaszkodzić dziecku.

Testy

Jeśli zostaniesz poproszony o dostarczenie wszelkich testów moczu należy poinformować lekarza, że pacjent Erytromycyna 250 mg kapsułki, może zakłócać, jak erytromycyna niektórych testów.

Ważne informacje o niektórych składnikach erytromycyna 250 mg kapsułki

Ten lek zawiera sacharozę. Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że ma nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ leku

Zawsze należy Capsules erytromycyna dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli nie jesteś pewien, skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Połykać w całości kapsułki przed lub podczas posiłku. Nie należy żuć kapsułek. Czy nie dać do dzieci, które nie potrafią połykać kapsułki w całości.

Dorośli (w tym osoby starsze)

Zalecana dawka wynosi 2 kapsułki (500 mg) dwa razy na dobę lub 1 kapsułka (250 mg) cztery razy na dobę, przyjmowana przed lub podczas posiłku.

Lekarz może zalecić inną dawkę leku w zależności od stanu. Zostaniesz leczony. Jeśli całkowita dawka dzienna jest wykonana większe niż jest 4 kapsułki (1000 mg), należy wziąć

Erytromycyna 250 mg kapsułki 3 lub 4 razy dziennie.

Dzieci

Dawka dla dzieci zależy od masy ciała dziecka.

Nie dać się dzieci, które nie potrafią połykać kapsułki w całości

Dawka zwykle wynosi od 30 mg do 50 mg 250 mg kapsułki erytromycyny dla każdego kg waga. Lekarz dokładną dawkę. Ustalony kurs powinien być zawsze zakończona.

Zażycie większej leku niż zalecana

Jeśli (lub ktoś inny) zbyt wielu kapsułek, należy skontaktować się z najbliższym poszkodowanego w szpitalu departament lub niezwłocznie poinformować lekarza. Objawy przedawkowania to nudności, wymioty i biegunka.

Zabrać wszystkie pozostałe kapsułki i opakowanie były w ze sobą do szpitala.

Jeśli pacjent zapomni zażyć lek

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy przyjąć ją tak szybko, jak to ją, a następnie przyjąć kolejną dawkę w prawidłowy czas. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku:

Zachowaj leku dopóki lekarz nie zaleci, aby zatrzymać. **NIE przerywać**, tylko dlatego, poczujesz się lepiej. Przerwanie stosowania leku, stan może ponownie wystąpić lub gorzej.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Erytromycyna 250 mg kapsułki może powodować działania niepożądane, chociaż nie każdego one wystąpią.

Przerywać stosowania leku i natychmiast poinformować lekarza, lub do wypadku i awaryjne, jeśli:

♣ reakcje alergiczne (które mogą być poważne). Objawy obejmują zaczerwienienie skóry, które mogą być

swędzenie, obrzęk twarzy i języka, gorączka, ból w klatce piersiowej i anafilaksja (oddychanie trudności)

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących i martwić. Najbardziej częste działania niepożądane:

- nudności
- biegunka
- dyskomfort w jamie brzusznej
- wymioty

Sporadyczne działania niepożądane:

- zamieszanie
- omamy
- zawrót głowy
- nieprawidłowości bicia serca (palpitacje)
- zajęcie (pasuje)
- słuchowe problemy (związane z bardzo dużych dawkach)

Mniej częste działania niepożądane:

- żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)
- nieprawidłowe wyniki badań krwi funkcji wątroby

Rzadkie działania niepożądane:

- świąd i wysypki skórne
- zapalenie trzustki, co prowadzi do bólu brzucha
- długoterminowe stosowanie erytromycyny 250 mg kapsułki jest związana ze wzrostem bakterie i grzyby, nie wrażliwe na ten antybiotyk może zawierać poważne zakażenie obejmująca jelito grube

Bardzo rzadkie działania niepożądane:

- ciężka reakcja skórna, ze ból, powstawanie pęcherzy i owrzodzeń
- Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów niepożądanych lub jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione proszę powiedzieć Twój lekarz lub farmaceuta.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ leku

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

KEEP OUT NIEDOSTĘPNYM I niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przenosić leku do innego pojemnika.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Zapytać farmaceutę

co zrobić z lekami, które nie jest już wymagane. Takie postępowanie pomoże chronić środowiska.

6. INNE INFORMACJE

Co Erytromycyna Kapsułki 250mg zawierać

Substancją czynną jest: erytromycyna (250 mg)

Pozostałe składniki to: neutral mikrogranulki (zawierający sacharozę i skrobię kukurydzianą)
hydroksypropylometylocelulozy, triacetyna, kwasu metakrylowego i akrylanu etylu, a talk. Otoczka kapsułki zawiera żelatynę.

Co Erytromycyna Kapsułki 250mg wygląda i co zawiera opakowanie

Kapsułki są erytromycyna dojelitowe, kapsułki twarde.
Kapsułki dostępne są w opakowaniach po 28 i 30. Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Athlone Pharmaceuticals Limited, Ballymurray, Roscommon, Irlandia

Producent

Ethypharm, ZI Saint Arnoult, 28170 Châteauneuf-en-Thymerais, Francja

Dystrybutor

Kent Pharmaceuticals Limited, Repton Road, Measham, DE12 DT, UK
PL 30464/0061

Ulotki zaktualizowany grudnia 2011