

Bipacksedel: Information till användaren

## **Dalacin**

2 % vaginal kräm  
klindamycin

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Dalacin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dalacin
3. Hur du använder Dalacin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dalacin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### **1. Vad Dalacin är och vad det används för**

Dalacin vaginalkräm är avsedd att användas direkt i slidan (s.k. lokal användning). Krämen innehåller klindamycinfosfat, ett bakteriehämmande medel (antibiotikum) som används för att behandla bakterieinfektioner i slidan som kallas bakteriell vaginos.

### **2. Vad du behöver veta innan du använder Dalacin**

#### **Använd inte Dalacin**

- om du är allergisk mot klindamycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du är allergisk mot linkomycin
- om du har, eller tidigare haft, en inflammation i tjocktarmen som orsakats av antibiotika.

## Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dalacin vaginalkräm.

Var särskilt försiktig med Dalacin vaginalkräm:

- -om du upplever svår diarré under behandlingen. Användningen av klindamycin kan orsaka överväxt av organismer som ej är känsliga för klindamycin, t.ex. svamp vilket kan ge upphov till svår diarré. Kontakta då din läkare så att kuren antingen kan avbrytas eller fortsätta under noggrann övervakning.

Du ska avstå från vaginala samlag eller användning av andra vaginala produkter (t.ex. tamponger och intimspray) under behandlingen med Dalacin vaginalkräm.

Dalacin vaginalkräm innehåller ämnen som kan skada latex och gummiprodukter såsom kondomer och pessrar. Användningen av sådana produkter rekommenderas därför *inte* vid användning av Dalacin vaginalkräm.

## Andra läkemedel och Dalacin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

## Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

### *Graviditet*

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör med läkare innan Dalacin vaginalkräm används under graviditet.

## *Amning*

Okänt huruvida klindamycin går över i modersmjölk via vaginalkrämen. Rådgör med läkare före användning av Dalacin vaginalkräm under amning.

## **Körförmåga och användning av maskiner**

Det är inte känt om Dalacin har effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

## **3. Hur du använder Dalacin**

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig. Dosen är vanligtvis en förfylld applikator (5 gram) varje kväll under 7 dagar. Sju plastapplikatorer följer med denna förpackning. Dessa är utformade för att möjliggöra administrationen av krämen i vagina.

### *Bruksanvisning:*

Ta av skruvlocket från krämtuben. Skruva fast en plastapplikator på den gängade änden. Tryck försiktigt ner krämen i applikatorn. Applikatorn är fylld när införingskolven helt är ute. Skruva loss applikatorn från tuben och sätt på skruvlocket.

Intag ryggläge och för försiktigt in applikatorn i vagina så långt som möjligt. Tryck försiktigt in införingskolven tills den är helt inne. För försiktigt tillbaka applikatorn från vagina och släng applikatorn.

# Om du använt för stor mängd av Dalacin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Dalacin vaginalkräm kan ge upphov till effekter i andra delar av kroppen (s.k. systemiska effekter).

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

## 4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Frekvensen av möjliga biverkningar som listas nedan definieras enligt följande: vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare), mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

### Vanliga biverkningar

- jästinfektion i slidan
- irritation i slidan
- inflammation/infektion i slidan, vid livmodertappen eller runt slidöppningen
- klåda (utanför appliceringsstället)
- bukkramper

### Mindre vanliga biverkningar

- buksmärta, magkatarr, diarré, illamående, kräkningar, förstoppning, gasbildning
- flytningar, smärta i slidan
- svampinfektion i kroppen
- allergiska reaktioner, nässelutslag (urtikaria)
- huvudvärk
- urinvägsinfektion, smärtsam och besvärlig urinering, socker i urinen, protein i urinen
- hudutslag, hudrodnad
- dålig andedräkt
- yrsel, svindel

## **Ingen känd frekvens**

- inflammation med svullnad och/eller smärta
- slidkatarr orsakad av parasiten *Trichomonas vaginalis*
- bakterieinfektion, övre luftvägsinfektion, svampinfektion i huden
- onormalt mikrobiologiskt testresultat
- menstruationsrubbingar, blödningar från underlivet, endometrios, underlivs-/bäckensmärtor
- smakförändringar
- spänd buk, ryggsmärtor

Gravida kvinnor som behandlas kan också drabbas av svårighet att tömma urinblåsan, klåda eller rodnad.

## **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

## **Läkemedelsverket**

Box 26

751 03 Uppsala

[www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

## **5. Hur Dalacin ska förvaras**

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är klindamycinfosfat motsvarande 20 mg klindamycin.
- Övriga innehållsämnen är sorbitanstearat, polysorbit 60, propylenglykol, stearinsyra, cetostearylalkohol, cetylpalmitat, flytande paraffin, benzylalkohol, renat vatten.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Tub à 40 g vaginalkräm och 7 st engångsapplicatorer.

### **Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare**

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

Email: [eumedinfo@pfizer.com](mailto:eumedinfo@pfizer.com)

Denna bipacksedel ändrades senast 2013-12-10