

Bipacksedel: Information till användaren

Proscar

5 mg filmdragerade tabletter
finasterid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Proscar är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Proscar
3. Hur du använder Proscar
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Proscar ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Proscar är och vad det används för

Prostatakörteln är, hos en vuxen man, normalt stor som en valnöt. Den ligger alldeles under urinblåsan och omger urinröret. Proscar minskar nivåerna av dihydrotestosteron (DHT), ett hormon, som anses stimulera tillväxten av prostatakörteln vid stigande ålder. Behandling med Proscar minskar därmed storleken på den förstörade prostatan. Många av de besvär, som orsakas av en förstörad prostata, kan då förbättras.

Din doktor har ordinerat Proscar för att behandla en godartad prostataförstoring och/eller för att förebygga akut urinstämning och kirurgiska ingrepp till följd av prostataförstoring. Prostatabesvär drabbar många män över 50 år. När prostatan gradvis förstoras kan den trycka på urinröret (se bild) och på så vis försvaga eller till och med stoppa urinflödet. Typiskt är att

urinträngningarna kommer allt tätare, ofta nattetid. Andra besvär kan vara svårighet att "hålla tätt", att det tar tid att börja kasta vatten och/eller att strålen blir allt svagare. Det kan också vara svårt att tömma blåsan helt.

Du ska komma ihåg att det tog många år innan din prostata blev så förstörd att du kände av några besvär. Det kan därför ta tid innan prostatakörteln krymper och besvären blir mindre. Hur lång tid det tar beror på din ålder och hur omfattande sjukdomen hunnit bli. Även om snabb förbättring i urinstrålens kraft och andra symtom ses hos vissa patienter redan inom 2 veckor kan behandling i upp till 6 månader vara nödvändig för att man ska kunna bedöma effekten av behandlingen.



2. Vad du behöver veta innan du använder Proscar

Använd inte Proscar

- om du är kvinna
- om du är allergisk mot finasterid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Proscar ska inte användas av barn.

Varningar och försiktighet

- Tala med läkare innan du använder Proscar.
- En klinisk undersökning (även rektal undersökning) och en bestämning av prostataspecifikt antigen (PSA) i serum bör utföras före behandling med finasterid och under behandlingen.

Andra läkemedel och Proscar

Proscar kan normalt tas tillsammans med andra mediciner. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen använt andra läkemedel.

Proscar med mat och dryck

Tabletten kan tas med eller utan föda.

Graviditet och amning

- Proscar är endast avsett att användas av män. Om din sexualpartner är eller kan tänkas bli gravid, ska du undvika att hon exponeras för din sädesvätska eftersom den kan innehålla ytterst små mängder av läkemedlet.
- **kvinnor som är eller kan tänkas bli gravida ska inte handskas med krossade eller delade tabletter**
- på grund av möjligt upptag i kroppen eller genom huden av det verksamma ämnet i Proscar kan läkemedlet, om det används av en kvinna som bär på ett foster av manligt kön, hämma utvecklingen av fostrets könsorgan
- om en gravid kvinna kommer i kontakt med den aktiva substansen i Proscar ska en läkare rådfrågas
- Proscar tabletterna är filmdragerade vilket skyddar från kontakt med läkemedlets aktiva substans vid normal användning.

Kontakta din läkare om du har frågor.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inget som tyder på att Proscar påverkar din förmåga att köra bil eller att använda maskiner.

Proscar innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du rådgröra med din läkare innan du använder detta läkemedel.

3. Hur du använder Proscar

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Användning av detta läkemedel

- Vanlig dos är en tablett om dagen.
- Tabletten ska sväljas hel.
- Tabletterna kan tas med eller utan föda.

Din läkare informerar dig om hur länge du ska fortsätta använda Proscar. Avbryt inte behandlingen i utan att rådfråga din läkare. Även om det kan inträffa en snabb förbättring kan det vara nödvändigt att fortsätta behandlingen i minst sex månader för att kunna utvärdera resultatet av behandlingen.

Som vid all långtidsbehandling bör man ha fortsatt kontakt med sin läkare.

Om du använt för stor mängd av Proscar

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Proscar

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta bara nästa dos när det är dags.

Om du slutar att använda Proscar

Det är viktigt att du fortsätter att använda Proscar så länge som din läkare ordinerar läkemedlet till dig.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De biverkningar som observerats var oftast milda och försvann i många fall efter en tid även om patienterna fortsatte använda Proscar.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

- nedsatt lust till sex
- svårt att få erektion
- minskad mängd sädesvätska vid utlösning

Ingen av dessa biverkningar har förekommit hos fler än 4 av 100 patienter.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

- hudutslag
- problem med sexuell utlösning
- bröstömhet/bröstförstoring

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

- allergiska reaktioner, såsom klåda, nässelfeber och svullnad av läppar, tunga, svalg och ansikte
- depression
- hjärtklappning
- förhöjda levervärden
- kvarvarande erektionsproblem efter avslutad behandling
- kvarvarande nedsatt lust till sex efter avslutad behandling
- kvarvarande ejakulationsproblem efter avslutad behandling
- testikelsmärta
- manlig infertilitet och/eller dålig spermiekvalitet. Normalisering eller förbättring av spermiekvaliteten har rapporterats efter avslutad behandling med finasterid.

Kontakta snarast din läkare om du upptäcker förändringar i bröstet såsom knutor, smärta, förstora bröster eller förändring i bröstvårta, då detta kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd såsom bröstcancer.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se

5. Hur Proscar ska förvaras

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är finasterid. Varje tablett innehåller 5 mg finasterid.
- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 106 mg, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, natriumstärkelseglykolat, natriumdokusat, magnesiumstearat, talk, hypromellos, hydroxipropylcellulosa, färgämne (titandioxid E 171, gul järnoxid E 172, indigokarmin E 132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

- Proscar filmdragerade tabletter är förpackade i tryckförpackning.
- Tabletterna är blå, äppelformade, 7 mm långa tabletter märkta med 'MSD 72' på ena sidan och 'PROSCAR' på den andra sidan.
- Förpackningsstorlekar: 28 eller 98 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

[Visa större](#)

Innehavare av försäljningstillstånd:

Information:

Merck Sharp & Dohme B.V.

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

P.O. Box 581

Box 7125

2003 PC Haarlem

192 07 Sollentuna

Nederländerna

Tfn 08-578 135 00

Denna bipacksedel ändrades senast 2014-03-18