

Bipacksedel: Information till användaren

Canesten 200 mg vaginaltabletter klotrimazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Canesten vaginaltabletter måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information (se avsnitt 4), kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Hur Canesten vaginaltabletter verkar och vad de används för
2. Vad man bör beakta innan man börjar använda Canesten vaginaltabletter
3. Hur du använder Canesten vaginaltabletter
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Canesten vaginaltabletter ska förvaras
6. Ytterligare upplysningar

1. VAD CANESTEN VAGINALTABLETTER ÄR OCH VAD DE ANVÄNDS FÖR

Den aktiva substansen i Canesten vaginaltabletter är klotrimazol. Det är ett imidazolderivat med ett brett spektrum av aktivitet mot svampinfektioner. Ämnet antingen dödar eller begränsar svamparnas tillväxt och förökning. Klotrimazol är aktivt mot mikroorganismer så som hudsvamp, jästsvamp och mögelsvamp.

Canesten vaginaltabletter används för behandling av infektioner i slidan och de yttre könsorganen som förorsakats av svampar känsliga för klotrimazol. Infektionerna är vanligtvis orsakade av jästsvampen *Candida*. Symtom på infektionen är bl.a. klåda, sveda och vita flytningar.

2. VAD MAN BÖR BEAKTA INNAN MAN BÖRJAR ANVÄNDA CANESTEN VAGINALTABLETTER

Använd inte Canesten vaginaltabletter:

- om du är allergisk (överkänslig) mot klotrimazol eller mot något av övriga innehållsämnen i Canesten (anges i avsnitt 6).

Var särskilt försiktig med Canesten vaginaltabletter

Behandlingen ska inte påbörjas utan läkarordination

- om det är fråga om din första underlivsinfektion
- om du haft kroniskt återkommande infektioner under en lång period (minst 4 infektioner under det gångna året)
- om du är under 15 år eller i klimakterieåldern för att utesluta andra orsaker som klamydia eller cancer

- om du har feber (≥ 38 °C), smärtor i nedre buken, ryggsmärtor, illaluktande flytning från slidan, illamående, blödningar från slidan och/eller samtidig smärta i skuldrorna. Dessa symtom kan vara tecken på en gynekologisk sjukdom som t.ex. infektion, könssjukdom eller tumör. I sådana fall ska du kontakta en läkare.

Tamponger, vätskor för sköljning av slidan, spermicider eller andra preparat för vaginalt bruk bör inte användas samtidigt med Canesten.

Undvik samlag under behandlingen med preparatet eftersom infektionen kan smitta på sexpartnern. Canesten kan minska effekten av preventivmedel som är tillverkade av latex, så som kondom och pessar.

Canesten vaginaltabletter ska inte sväljas.

Andra läkemedel och Canesten vaginaltabletter

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Om du tar läkemedel som innehåller takrolimus eller sirolimus som aktiv substans via munnen, kontakta läkare innan du börjar använda vaginala Canesten preparat.

Det är även möjligt att koncentrationen av vissa läkemedel stiger i blodet om de används samtidigt med Canesten vaginaltabletter. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du är osäker på samtidig användning av ett läkemedel under behandling med Canesten vaginaltabletter.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid, eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Erfarenhet visar att ingen negativ inverkan vare sig på mor eller på barn är att vänta om Canesten vaginaltabletter används under graviditetens två sista trimesterier. Som säkerhetsåtgärd rekommenderas att undvika användning av klotrimazol under graviditetens första trimesterium (de tre första månaderna). Om en behandling skulle behövas under de tre första månaderna av graviditeten ska dock läkare konsulteras innan behandlingen inleds. Under graviditet bör applikator inte användas. Under graviditet förs vaginalkapseln in i slidan med fingrarna utan applikator för att undvika skada på livmoderhalsen.

Användning av Canesten vaginaltabletter rekommenderas inte under amning. Som försiktighetsåtgärd rekommenderas att amningen avbrytas under behandlingen.

Körförmåga och användning av maskiner

Canesten vaginaltabletter påverkar inte, eller mycket liteförmågan att köra bil eller använda maskiner.

3. HUR DU ANVÄNDER CANESTEN VAGINALTABLETTER

Använd detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vaginaltabletter 200 mg: 1 vaginaltablett införs djupt in i slidan varje kväll i 3 dagars tid.

Vaginaltablett ska med hjälp av medföljande applikatorn införas så djupt in i slidan som möjligt vid sängdags. Detta utförs bäst i ryggläge med lätt uppdragna ben. Slidan måste vara fuktig för att vaginaltablett ska upplösas helt. Annars kan det hända att osmälta delar av tablett kommer ut ur slidan. Om vaginaltablett inte upplöst helt t.o.m. nästa kväll, bör du överväga att använda Canesten vaginalkräm istället.

Behandling med Canesten vaginaltablett rekommenderas inte under pågående menstruation utan behandlingen bör avbrytas strax innan mensens börjar.

Oftast är både slidan och de yttre könsorganen infekterade. Om jästsvampinfektionen spritt sig till de yttre könsorganen, bör behandlingen med vaginaltablett kompletteras med lokala beredningsformer av Canesten (Canesten 20 mg/g vaginalkräm eller Canesten Kombi kombinationsförpackning, som innehåller Canesten 10 mg/g kräm och en Canesten vaginaltablett 500 mg). De yttre könsorganen ska behandlas med Canesten kräm/vaginalkräm som stryks på tunt 2–3 gånger per dygn tills det förflutit 3 dygn efter att besvären försvunnit, vilket innebär en total behandlingstid på 1–2 veckor.

En eventuell sexualpartner med symtom på svampinfektion ska behandlas samtidigt för att förhindra infektionsåterfall.


Om symtomen på svampinfektion inte tydligt avklingat inom sju dygn efter inledd behandling ska läkare konsulteras för att kontrollera orsaken till infektionen. Om symtomen förvärras under behandlingen med Canesten ska behandlingen genast avslutas och läkare konsulteras.

Preparatet är avsett för vuxna och barn över 15 år.

Canesten vaginaltablett är luktfria och missfärgar inte underkläder.

Bruksanvisning

Vaginaltablett 200 mg:



1. Tryck lätt på applikatorns mynning (B) så att den blir något oval. Placera vaginaltablett i applikatorn (B) med spetsen utåt.
2. För applikatorn innehållande vaginaltablett djupt in i slidan. Detta går bäst om du ligger på rygg med lätt uppdragna ben.
3. För in kolven (A) i hela dess längd i applikatorn. Dra därefter ut applikatorn med kolven intryckt.
4. Dra kolven (A) ut ur applikatorn. Delarna tvättas i varmt (ej kokande) tvålatten, sköljes i rinnande vatten och torkas omsorgsfullt.

Applikatorn kan användas på nytt.

Applicering av en vaginaltablett utan applikator:

Vaginaltabletten appliceras i slidan med fingrarna.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Canesten vaginaltabletter orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar kan uppstå: allergiska reaktioner (yrsel, blodtrycksfall, andfåddhet, nässelutslag), fjällande hud på könsorganen, klåda, utslag, svullnad, rodnad, obehagskänsla eller brännande känsla, sveda, irritation, smärta i bäckenområdet, smärtor i nedre buken, blödning från slidan, inklusive menstruationsliknande blödning.

Du ska avbryta behandlingen om du upplever lokala biverkningar eller allergiska reaktioner.

De lokala reaktionerna kan påminna om de symtom som själva infektionen förorsakar. Ibland kan det därför vara svårt att avgöra om symtomen beror på infektionen eller på läkemedelsbiverkning.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR CANESTEN VAGINALTABLETTER SKA FÖRVARAS

Detta läkemedel bör förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen: varje vaginaltablett innehåller 200 mg klotrimazol.
- Övriga innehållsämnen är kalciumlaktatpentahydrat, krospovidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, mjölksyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Canesten 200 mg vaginaltablett: 3 st. vaginaltabletter (vita, märkta med NR och Bayer) i folieförpackning. Förpackningen innehåller också en applikator för vaginaltabletten.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Bayer Oy, Pansiovägen 47, 20210 Åbo, Finland

Tillverkare

Bayer Pharma AG, DE-51368 Leverkusen, Tyskland.

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Bayer Oy, Consumer Care, Kägelstranden 12, 02150 Esbo. Tel. 020 78521, fax 020 7858214.

Denna bipacksedel godkändes senast 20.1.2015