

# KEFEXIN 250 mg, 500 mg och 750 mg filmdragerade tabletter

---

## BIPACKSEDEL

### Kefexin 250 mg, 500 mg och 750 mg filmdragerade tabletter

Cefalexin

#### **Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.**

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

#### **I denna bipacksedel finner du information om:**

1. Vad Kefexin är och vad det används för
2. Innan du använder Kefexin
3. Hur du använder Kefexin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kefexin ska förvaras
6. Övriga upplysningar

## **1. VAD KEFEXIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR**

Cefalexin är ett antibiotika, som tillhör gruppen cefalosporiner. Cefalexin används för behandling av infektioner, som förorsakas av olika bakterier. Oftast används det vid behandling av akuta urinvägs-, luftrörs- eller hudinfektioner.

Läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för någon annan sjukdom än de som är angivna i bipacksedeln.

## **2. INNAN DU ANVÄNDER KEFEXIN**

### **Använd inte Kefexin om:**

- du är allergisk (överkänslig) mot cefalexin eller något av de övriga innehållsämnen i Kefexin
- du är allergisk (överkänslig) mot andra cefalosporiner.

### **Var särskilt försiktig med Kefexin om:**

- du tidigare har fått eksem eller andra allergisymtom vid användning av penicilliner eller andra antibiotika
- du lider av nedsatt njurfunktion
- du lider eller har led av gastrointestinala sjukdomar (särskilt kolit)
- du lider av akut porfyri (en ämnesomsättningssjukdom).

Tala om för läkaren om något av de ovan nämnda gäller eller har gällt dig.

Cefalexin kan ge felaktiga positiva resultat vid kontroller av uringlukos (gäller ej enzymatiska metoder).

### **Användning av andra läkemedel**

Berätta för läkaren om alla andra läkemedel som du använder. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner, naturprodukter och naturmedel. Glöm inte att nämna de läkemedel som du nyligen använt.

Effekten av vissa läkemedel eller av Kefexin kan förändras eller du kan få biverkningar, om de används samtidigt. Till dessa läkemedel hör:

- Samtidig användning av stora doser av kefalosporin med vissa antibiotika (aminoglykosider och polymyxin) eller vätskedrivande medel kan leda till nedsatt njurfunktion. Om Kefexin används enligt doseringsanvisningarna, är detta osannolikt.
- Effekten av p-piller kan minskas under behandlingen med kefalexin
- Probenesid (läkemedel mot gikt) minskar utsöndringen av kefalexin från kroppen, då halten av kefalexin i serumet ökar.

Berätta för läkaren också om du lider av andra sjukdomar eller allergier.

### **Graviditet och amning**

Cefalexin kan användas enligt anvisningarna under graviditet och amning. Kom dock ihåg att berätta för läkaren att du är gravid eller att du ammar. Om ett barn som du ammar får hudutslag eller andra allergisymtom, bör du omedelbart sluta att ta läkemedlet, avbryta amningen och kontakta din läkare.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Kefexin påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

### **Viktig information om något innehållsämne Kefexin**

Kefexin tabletter innehåller laktos 67,5 mg (250 mg tablett), 135,0 mg (500 mg tablett) och 90,86 mg (750 mg tablett). Om du inte tål visa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

## **3. HUR DU ANVÄNDER KEFEXIN**

Använd alltid Kefexin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är:

#### Vuxna och barn över 6 år, över 30 kg barnet:

1-4 g i dygnet uppdelat på 2-4 doser. I lindrig inflammation (infektioner i övre luftvägs, hud och mjukdelat också inflammation i urinblåsan) kan dygndosen uppdelas på 2 doser.

#### Barn under 6 år, under 30 kg barnet:

25-50 (-100) mg/kg/dygn uppdelat på 2-4 doser.

Följ doseringsföreskriften möjligast noggrant och ta läkemedlet regelbundet. Det är bra att planera medicineringen så att den passar dags- och sömnrutmen.

Ta kuren till slut fast symtomen skulle försvinna redan några dagar efter att medicineringen påbörjats. Det kan vara att en del av bakterierna fortfarande kan föröka sig fastän symtomen redan försvunnit, varför sjukdomen kan återkomma. De kvarblivna bakterierna kan också utveckla resistens mot antibiotika och det blir då svårare att förintad dem om sjukdomen upprepas.

### **Om du har tagit för stor mängd av Kefexin**

Om du fått i dej för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 09-471977, centralen 09-4711).

De mest allmänna symtomen vid överdosering är illamående, räckning, smärta i abdominal hinna, diarré och blod i urinen.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

### **Om du har glömt att ta Kefexin**

Om du glömmer att ta en eller ett par doser, ta en dos så snart du kan, och återgå sedan till den ordinerade doseringen.

## **4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR**

Liksom alla läkemedel kan Kefexin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (hos färre än en av 10):

- diarré, illamående, magont

Mindre vanliga (hos färre än en av 100):

- eksem, nässelfeber

Sällsynta (hos färre än en av 1 000):

- ökning av antalet av en viss typ av vita blodkroppar (eosinofili)
- serumsjuka
- svullnad i struphuvudet
- hepatit, gulsot (obstruktionsikterus), tillfälligt förhöjda levervärden (ASAT- och ALAT-värden)
- generaliserad exantematös pustulos
- klåda i genital och anal område, odefinierad inflammation i vagina och i kvinnans yttre könsorgan

Mycket sällsynta (hos färre än en av 10 000):

- lågt antal blodplättar (trombocytopeni), lågt antal vita blodkroppar (neutropeni, agranulocytos), anemi som beror på nedbrytning av de röda blodkropparna (hemolytisk anemi)
- anafylaxi
- toxisk psykos
- huvudvärk, svindel
- inflammation i munnen, melena, inflammation i tarmen (pseudomembranös kolit), tarmpseudo obstruktion, missfärgning av tänderna
- hudens sjukdom (Lyells syndrom), blåsbildning i huden (pemfigus vulgaris), Stevens-Johnsonin syndrom
- artrit
- inflammation i njurarna åtföljt av blod i urinen

Om biverkningen du upplever är allvarlig eller om den inte nämns i bipacksedeln, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## 5. HUR KEFEXIN SKA FÖRVARAS

Förvaras i originalförpackningen vid högst 25 °C. Preparatet är fukt- och ljuskänsligt.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

Mediciner ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är cefalexin , varav det finns 250 mg, 500 mg eller 750 mg per tablett.
- Övriga innehållsämnen i tabletkärnan är makrogol 6000, magnesiumstearat, natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon (K25), laktosmonohydrat.
- Övriga innehållsämnen i filmdrageringen är sackarinnatrium, peppermynsolja, titandioxid (E171), talk och hypromellos.

### Läkemedlets utseende

250 mg tablett: Rund (diameter ca 10 mm), konvex vit eller gulaktig filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Tabletten är märkt med koden "CX" ovanför skåran och med koden "250" nedanför skåran.

500 mg tablett: Vit eller gulaktig, oval, bikonvex filmdragerad tablett med skåra på båda sidorna, storlek ca 7 x 18 mm.

750 mg tablett: Vit eller gulaktig, oval, bikonvex filmdragerad tablett med skåra på båda sidorna, storlek ca 10 x 17 mm.

**Innehavare av godkännande för försäljning**

Orion Corporation  
Orionvägen 1  
02200 Esbo

**Tillverkare**

Orion Pharma  
Orionvägen 1  
02200 Esbo

**Bipacksedeln reviderad**

30.3.2010