

Bipacksedel: Information till användaren

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

800 mg och 1 g filmdragerade tabletter
fenoximetylpenicillinkalium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Fenoximetylpenicillin EQL Pharma är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fenoximetylpenicillin EQL Pharma
3. Hur du använder Fenoximetylpenicillin EQL Pharma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fenoximetylpenicillin EQL Pharma ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fenoximetylpenicillin EQL Pharma är och vad det används för

Den aktiva substansen i Fenoximetylpenicillin EQL Pharma, fenoximetylpenicillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma används vid halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation, bakteriella infektioner i hud och underhud (som t.ex. inflammation i bindväven, Borreliainfektion).

Fenoximetylpenicillin som finns i Fenoximetylpenicillin EQL Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Använd inte Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Om du är allergisk (överkänslig) mot penicilliner eller något av övriga innehållsämnen i Fenoximetylpenicillin EQL Pharma.

Varningar och försiktighet

Om du är överkänslig mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare om detta innan Fenoximetylpenicillin EQL Pharma används.

Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och läkare kontaktas.

Andra läkemedel och Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta då vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Fenoximetylpenicillin EQL Pharma, t ex vissa läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat) eller mot gikt (probenecid).

Effekten av p-piller kan eventuellt påverkas av behandling med Fenoximetylpenicillin EQL Pharma.

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma med mat och dryck

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma har bäst effekt om det tas på fastande mage, eller minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Rådgör med läkare vid användning av Fenoximetylpenicillin EQL Pharma under graviditet.

Fenoximetylpenicillin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Fenoximetylpenicillin EQL Pharma under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma innehåller povidon, mikrokristallin cellulosa, talk, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, titandioxid (E171)

3. Hur du använder Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

Användning för barn och ungdomar

Ta alltid Fenoximetylpenicillin EQL Pharma enligt läkarens anvisningar. Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på infektionstyp och kroppsvikt. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Fenoximetylpenicillin EQL Pharma-kuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka att infektionen återkommer.

Om du har tagit för stor mängd av Fenoximetylpenicillin EQL Pharma:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Fenoximetylpenicillin EQL Pharma:

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Fenoximetylpenicillin EQL Pharma orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Magbesvär, främst illamående eller lös avföring samt hudutslag.

Mindre vanliga: (färre än 1 person av 100 drabbas): Överkänslighetsreaktion med feber och/eller ledvärk. Nässelutslag, blodbildsförändring (eosinofili).

Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion).

Vid långvarig eller svår diarré bör du kontakta läkare.

Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Fenoximetylpenicillin EQL Pharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.

Tabletterna används före utgångsdatum som står på förpackningen efter Utg. Dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma innehåller

1 tablett innehåller:

Den aktiva substansen är fenoximetylpenicillinkalium 800 mg respektive 1 gram.

Övriga innehållsämnen är povidon, mikrokristallin cellulosa, talk, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

800 mg: vita till benvita ovala, 19,5 x 8,5 mm, filmdragerade tabletter, märkta med "7" och "3" på varsin sida av skåran på tablettens ena sida och med "F" på tablettens andra sida.

1g: vita till benvita ovala, 21 x 9,5 mm, filmdragerade tabletter, märkta med "E" och "86" på varsin sida av skåran på tablettens ena sida och omärkta på tablettens andra sida.

Förpackningsstorlek:

14, 20, 30, 40 och 100 tabletter

Innehavare av godkännande för försäljning

EQL Pharma AB
Stortorget 1
222 23 Lund
Sverige

Tillverkare

APL Swift Services Malta Ltd
HF26, Hal Far Industrial Estate
Hal Far Birzebbugia
BBG 3000
Malta

Denna bipacksedel ändrades senast 2016-06-14